

***A kiemelt indikációhoz kötött támogatási
kategóriába tartozó betegségcsoportok,
indikációs területek és a felírásra jogosultak köre***

Kiemelt, indikációhoz kötött támogatással rendelheti**EÜ 100 százalékos támogatási kategória****EÜ100 1.****Támogatott indikációk:**

>> Insulinkezelésre szoruló (önmagában vagy orális antidiabetikum mellett) cukorbeteg

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- ACTRAPID PENFILL 100 NEMZETKÖZI EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml patronban	EU/1/02/230/006
- ACTRAPID 100 NEMZETKÖZI EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x10ml injekciós üvegben	EU/1/02/230/003
- HUMULIN M3 (30/70) 100 NE/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml patronban	OGYI-T-05928/02
- HUMULIN N 100 NE/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml patronban	OGYI-T-05932/02
- HUMULIN R 100 NE/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml patronban	OGYI-T-05933/02
- INSULATARD PENFILL 100 NE/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml	EU/1/02/233/006
- INSULATARD 100 NE/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ INJEKCIÓS ÜVEGBEN (10 ML)	1x10 ml	EU/1/02/233/003
- INSUMAN BASAL SOLOSTAR 100 NE/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/97/030/148
- INSUMAN BASAL 100 NE/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml	EU/1/97/030/035
- INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR 100 NE/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/97/030/160
- INSUMAN COMB 25 100 NE/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml	EU/1/97/030/045
- INSUMAN COMB 50 100 NE/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml	EU/1/97/030/050
- INSUMAN RAPID SOLOSTAR 100 NE/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3 ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/97/030/142
- INSUMAN RAPID 100 NE/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml	EU/1/97/030/030

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E10, E11, E12, O24

EÜ100 2.**Támogatott indikációk:**

- >> Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást ($HbA_{1c} < 8,0\%$) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60-90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikæmia jelentkezik.
- >> Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikæmia jelentkezik.
- >> 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három - legalább két hónap különbséggel mért - HbA_{1c} értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a HbA_{1c} értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikæmiás eseménye volt.)
- >> A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében
 - legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást ($HbA_{1c} < 8,0\%$) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60-90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikæmia jelentkezik.
 - legalább fél évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért HbA_{1c} értéke közül kettő 8,0% alatt van.
- >> A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- APIDRA 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN (SOLOSTAR)	5x3ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/04/285/032
- APIDRA 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml	EU/1/04/285/008
- FIASP 100 EGYSÉG/ML FLEXTouch OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	10x3ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/16/1160/006
- FIASP 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ INJEKCIÓS ÜVEGBEN	1x10ml injekciós üvegben	EU/1/16/1160/007
- HUMALOG 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3ml patronban	EU/1/96/007/023
- HUMALOG 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ÜVEGBEN	1x10ml injekciós üvegben	EU/1/96/007/002
- LIPROLOG 100 EGYSÉG/ML JUNIOR KWIKPEN OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/01/195/030
- LIPROLOG 200 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/01/195/028
- NOVORAPID FLEXPEN 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	10x3ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/99/119/010
- NOVORAPID PENFILL 100 E/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3ml patronban	EU/1/99/119/006

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- NOVORAPID 100 E/ML OLDATOS INJEKCIÓ INJEKCIÓS ÜVEGBEN	1x10 ml	EU/1/99/119/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E10, E11, E12, O24

EÜ100 3.

Támogatott indikációk:

- >> Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikæmia jelentkezik.
- >> Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikæmia jelentkezik.
- >> 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három - legalább két hónap különbséggel mért - HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikæmiás eseménye volt.)
- >> A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében
 - legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikæmia jelentkezik.
 - legalább fél évig az EÜ50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van.
- >> A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- ABASAGLAR 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3ml patronban	EU/1/14/944/009
- LANTUS SOLOSTAR 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban (solostar)	EU/1/00/134/033
- LANTUS 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml	EU/1/00/134/006
- LEVEMIR 100 E/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3 ml	EU/1/04/278/003
- TOUJEO 300 EGYSÉG/ML DOUBLESTAR OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	3x3ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/00/133/038
- TOUJEO 300 EGYSÉG/ML SOLOSTAR OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x1,5ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/00/133/035
- TRESIBA 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	EU/1/12/807/004

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E10, E11, E12

EÜ100 4.

Támogatott indikációk:

>> Myasthenia gravis

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekeurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényessége ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- MESTINON 60 MG BEVONT TABLETTA	150x üvegben (barna)	OGYI-T-00517/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G70

EÜ100 5.

Támogatott indikációk:

>> Tetanusz profilaxis dokumentáltan szükséges eseteiben

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Háziorvos	Megkötés nélkül	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- SZCZEPIONKA TÊ ⁻ COWA ADSORBOWANA (T) - ADSORBED TETANUS VACCINE (T), SUSPENSION FOR INJECTION - PHARMAROAD	3x	R/0035 (PL)
- TETANOL PUR SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN - MAB PHARMA	10x0,5ml előretöltött fecskendőben tűvel	OGYÉI /14802-2/2017
- TETANOL PUR SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN - PHARMAROAD	1x0,5ml előretöltött fecskendőben tűvel	OGYÉI /15987-2/2017
- TETANOL PUR SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN - PHOENIX	10x0,5ml előretöltött fecskendőben tűvel	OGYÉI /10025-2/2017
- TETIG 500 NE OLDATOS INJEKCIÓ	1x ampulla	OGYI-T-09471/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Z298

EÜ100 6/a.**Támogatott indikációk:**

>> Házi oxigénellátásban részesülő beteg részére - dokumentáltan szükséges esetben, a beteg részére történő betanítással és átadással

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő és gyermek kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermektüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 24 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- OXYGENIUM (GÁZ) 20 L 200 BAR	4 m3	Ph. Hg. VIII.

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J95, J96, J98, J99

EÜ100 6/b.**Támogatott indikációk:**

>> Tartós házi oxigénellátásban részesülő beteg részére, akinek életvitelében dokumentáltan jelentős javulást eredményez az oxigéngázhoz képest, a beteg részére történő betanítással és átadással

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- OXYGENIUM (CSEPPFOLYÓS) FREELOX (32 L)	1 töltés	Ph. Hg. VIII.
- OXYGENIUM (CSEPPFOLYÓS) HEIMOX (36 L)	1 töltés	Ph. Hg. VIII.
- OXYGENIUM (CSEPPFOLYÓS) LIBERATOR (30 L)	1 töltés	Ph. Hg. VIII.
- OXYGENIUM (CSEPPFOLYÓS) OXYBLU (37 L)	1 töltés	Ph. Hg. VIII.

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J95, J96, J98, J99

EÜ100 7/a.

Támogatott indikációk:

>> Transzplantált beteg részére az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Csecsemő és gyermek kardiológia	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermekektől gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermekeksebészet	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermekek tüdőgyógyászata	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Haematológia	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Kardiológia	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Mellkassebészet	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Nephrológia	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Sebészet	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Szívsebészet	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Tüdőgyógyászati	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Belgyógyászati	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Csecsemő-gyermekegyógyászati	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Gastroenterológia	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Gyermekeksebészet	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Haematológia	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Kardiológia	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Nephrológia	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Sebészet	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Szívsebészet	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Tüdőgyógyászati	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ADVAGRAF 0,5 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	50x	EU/1/07/387/002
- ADVAGRAF 1 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	60x	EU/1/07/387/005
- ADVAGRAF 3 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	50x	EU/1/07/387/012
- ADVAGRAF 5 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	50x	EU/1/07/387/008
- CELLCEPT 250 MG KAPSZULA	100x buboréksomagolásban	EU/1/96/005/001
- CELLCEPT 500 MG FILMTABLETTA	50x buboréksomagolásban	EU/1/96/005/002
- CERTICAN 0,25 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-09961/06
- CERTICAN 0,5 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-09961/01
- CERTICAN 0,75 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-09961/03
- DEXAMETHASONE KRKA 20 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-23079/35

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- DEXAMETHASONE KRKA 4 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-23079/09
- DEXAMETHASONE KRKA 40 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-23079/47
- DEXAMETHASONE KRKA 8 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-23079/23
- ENVARISUS 0,75 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/14/935/001
- ENVARISUS 1 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/14/935/004
- ENVARISUS 1 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/14/935/005
- ENVARISUS 4 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/14/935/007
- IMURAN 25 MG FILMTABLETTA	100x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban	OGYI-T-00665/02
- IMURAN 50 MG FILMTABLETTA	100x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban	OGYI-T-00665/01
- MEDROL 100 MG TABLETTA	20x	OGYI-T-00907/05
- MEDROL 16 MG TABLETTA	50x	OGYI-T-00907/03
- MEDROL 32 MG TABLETTA	20x	OGYI-T-00907/04
- MEDROL 4 MG TABLETTA	100x	OGYI-T-00907/02
- MYFENAX 250 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x buboréksomagolásban	EU/1/07/438/001
- MYFENAX 500 MG FILMTABLETTA	50x buboréksomagolásban	EU/1/07/438/003
- MYFORTIC 180 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-10075/02
- MYFORTIC 360 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-10075/01
- PROGRAF 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-08681/01
- PROGRAF 1 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-07280/01
- PROGRAF 5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-07281/01
- RAPAMUNE 0,5 MG BEVONT TABLETTA	100x buboréksomagolásban	EU/1/01/171/014
- RAPAMUNE 1 MG BEVONT TABLETTA	100x buboréksomagolásban	EU/1/01/171/008
- RAPAMUNE 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x60ml +30 adagolófecskendő+1 fecskendő adapter+1 carryng case	EU/1/01/171/001
- RAPAMUNE 2 MG BEVONT TABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/01/171/009
- SANDIMMUN NEORAL 10 MG LÁGY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/02
- SANDIMMUN NEORAL 100 MG LÁGY KAPSZULA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/05
- SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x50ml üvegben	OGYI-T-04200/01
- SANDIMMUN NEORAL 25 MG LÁGY KAPSZULA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/03
- SANDIMMUN NEORAL 50 MG LÁGY KAPSZULA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/04
- TACFORIUS 5 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	50x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/17/1244/024

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Z940, Z941, Z942, Z944, Z948

Kijelölt intézet

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 7/b.**Támogatott indikációk:**

- >> Szerv transzplantáción átesett betegek részére CMV betegség megelőzésére fenyegető rejectio (GVH) esetén
- >> CMV retinitis indukciós és fenntartó kezelésére szerzett immunhiányos állapotban (AIDS-ben)

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- VALCYTE 450 MG FILMTABLETTA	60x hdpe tartályban	OGYI-T-09016/01
- VALGANCIKLOVIR ONKOGEN 450 MG FILMTABLETTA	60x hdpe tartályban	OGYI-T-23780/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): B2020, Z940, Z941, Z942, Z944, Z948**Kijelölt intézet**

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 8/a1.**Támogatott indikációk:**

- >> Rosszindulatú daganatos betegség miatt végzett kemoterápia/irradiáció során fellépő súlyos lázas neutropénia esetén, vagy olyan esetben, ha a lázas neutropénia kockázata a 20%-ot meghaladja
- >> Perifériás őssejt gyűjtés esetén

Támogatott indikációk:

>> Csontvelő átültetésben részesülő betegek, akik hosszan tartó, súlyos neutropeniának lehetnek kitéve

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Fekvőbeteg gyógyintézeti járóbeteg szakr.	háttérrel rendelkező Haematológia	írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti járóbeteg szakr.	háttérrel rendelkező Klinikai onkológia	írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti járóbeteg szakr.	háttérrel rendelkező Sugártherápia	írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti járóbeteg szakr.	háttérrel rendelkező Gyermek hemato-onkológia	javasolhat és írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ACCOFIL 30 MILLIÓ E/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	5x0,5ml előretöltött fecskendőben védőhüvellyel	EU/1/14/946/008
- ACCOFIL 30 MILLIÓ E/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	7x0,5ml előretöltött fecskendőben +7 alkoholos törlőkendő	EU/1/14/946/017
- ACCOFIL 48 MILLIÓ E/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	5x0,5ml előretöltött fecskendőben védőhüvellyel	EU/1/14/946/014
- ACCOFIL 48 MILLIÓ E/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	7x0,5ml előretöltött fecskendőben +7 alkoholos törlőkendő	EU/1/14/946/018
- NIVESTIM 30 MILLIÓ EGYSÉG (300 MIKROGRAMM/0,5 ML) OLDATOS INJEKCIÓ/INFÚZIÓ	5x0,5ml előretöltött fecskendőben	EU/1/10/631/005
- NIVESTIM 48 MILLIÓ EGYSÉG (480 MIKROGRAMM/0,5 ML) OLDATOS INJEKCIÓ/INFÚZIÓ	5x0,5ml előretöltött fecskendőben	EU/1/10/631/008
- RATIOGRASTIM 30 MILLIÓ NE/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	5x0,5ml előretöltött fecskendőben biztonsági védőeszközzel	EU/1/08/444/010
- RATIOGRASTIM 48 MILLIÓ NE/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	5x0,8ml előretöltött fecskendőben	EU/1/08/444/006
- RATIOGRASTIM 48 MILLIÓ NE/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	5x0,8ml előretöltött fecskendőben biztonsági védőeszközzel	EU/1/08/444/012
- ZARZIO 30 MILLIÓ E/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	5x0,5ml előretöltött fecskendőben	EU/1/08/495/003
- ZARZIO 48 MILLIÓ E/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	5x0,5ml előretöltött fecskendőben	EU/1/08/495/007

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): R72

EÜ100 8/a2.

Támogatott indikációk:

>> Kizárólag szekunder profilaxisban, amennyiben a megelőző kemoterápiás ciklusban grade 3-4-es fokozatú neutropeniához társulóan az alábbiak közül valamelyik neutropeniás komplikáció következett be:

- neutropénia miatti antibiotikus vagy antimikotikus kezelés;
- neutropénia miatti hospitalizáció;
- neutropénia miatti dózishalasztás vagy dóziscsökkentés;
- febrilis neutropénia.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Megkötés nélkül	Nincs jogosultsága
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező Gyermek hemato-onkológia		írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező Haematológia		írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező Klinikai onkológia		írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- FULPHILA 6 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,6ml előretöltött fecskendőben tűvédővel	EU/1/18/1329/002
- GRASUSTEK 6 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,6ml előretöltött fecskendőben	EU/1/19/1375/001
- PELGRAZ 6 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben (tűvédővel)+1 db alkoholos vattapamacs	EU/1/18/1313/001
- PELGRAZ 6 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKTORBAN	1x előretöltött injektorban+1 alkoholos vattapamacs	EU/1/18/1313/002
- PELMEG 6 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,6ml előretöltött fecskendőben	EU/1/18/1328/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): R72

EÜ100 8/b1.

Támogatott indikációk:

>> Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint I. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Megkötés nélkül	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ALGOPYRIN 1 G/2 ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x2ml opc ampullában	OGYI-T-07845/03
- ALGOZONE 500 MG TABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-10239/02
- METAMIZOL STADA 500 MG TABLETTA	20x buboréksomagolásban átlátszatlan pvc//al/papír	OGYI-T-23846/03
- OPTALGIN 500 MG TABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-22029/02
- PANALGORIN 500 MG TABLETTA	1x10 buboréksomagolásban	OGYI-T-04536/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C, R521, R5290

EÜ100 8/b2.**Támogatott indikációk:**

>> Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint II. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Megkötés nélkül	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- ADAMON 100 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	10x buboréksomagolásban	OGYI-T-06970/04
- ADAMON 150 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	10x buboréksomagolásban	OGYI-T-06970/07
- ADAMON 50 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-06970/02
- CONTRAMAL 100 MG RETARD FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-04975/07
- CONTRAMAL 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK	1x10ml üvegben	OGYI-T-04975/04
- CONTRAMAL 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK ADAGOLÓPUMPÁVAL	1x96ml üvegben	OGYI-T-04975/05
- CONTRAMAL 150 MG RETARD FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-04975/09
- CONTRAMAL 200 MG RETARD FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-04975/11
- CONTRAMAL 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-04975/02
- CONTRAMAL 50 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x1ml ampulla	OGYI-T-04975/13
- CONTRAMAL 50 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x2ml ampulla	OGYI-T-04975/03
- CURIDOL 37,5 MG/325 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22226/01
- DHC CONTINUS 60 MG RETARD TABLETTA	20x pp tartályban	OGYI-T-01635/01
- DHC CONTINUS 60 MG RETARD TABLETTA	56x pp tartályban	OGYI-T-01635/02
- DORETA SR 75 MG/650 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al/papír)	OGYI-T-21059/50
- DORETA 37,5 MG/325 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-21059/04
- DORETA 75 MG/650 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-21059/14
- RALGEN SR 100 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-20310/03
- RALGEN SR 100 MG RETARD TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-20310/04
- RALGEN SR 150 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-20310/07
- RALGEN SR 150 MG RETARD TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-20310/08
- RALGEN SR 200 MG RETARD TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-20310/12

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- RALGEN 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-20310/15
- TRAMADOL ZENTIVA 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK	1x10ml üvegben	OGYI-T-07724/01
- TRAMADOL ZENTIVA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-07724/06
- TRAMADOL ZENTIVA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-07724/07
- TRAMADOLOR 100 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-08179/01
- TRAMADOLOR 100 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-08179/02
- TRAMADOLOR 150 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-08179/08
- TRAMADOLOR 150 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-08179/09
- TRAMADOLOR 200 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-08179/05
- TRAMADOLOR 200 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-08179/06
- TRAMADOLOR 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-08179/03
- TRAMCET 37,5 MG/325 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22206/03

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C, R520, R522

EÜ100 8/b3.

Támogatott indikációk:

>> Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint III. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Megkötés nélkül	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- CODOXY 10 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21706/06
- CODOXY 20 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21706/10
- CODOXY 40 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21706/14
- CODOXY 5 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21706/02
- DOLFORIN 100 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-20594/10
- DOLFORIN 25 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	10x tasakban	OGYI-T-20594/02
- DOLFORIN 25 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-20594/01
- DOLFORIN 50 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-20594/04
- DOLFORIN 75 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-20594/07
- DUROGESIC 100 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban pet/ldpe/al/akrilnitril	OGYI-T-04530/04

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- DUROGESIC 25 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x védőtasakban pet/ldpe/al/akrilnitril	OGYI-T-04530/01
- DUROGESIC 50 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x védőtasakban pet/ldpe/al/akrilnitril	OGYI-T-04530/02
- DUROGESIC 75 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban pet/ldpe/al/akrilnitril	OGYI-T-04530/03
- FENTANYL SANDOZ MAT 100 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS MÁTRIX TAPASZ	5x védőtasakban	OGYI-T-20155/09
- FENTANYL SANDOZ MAT 25 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS MÁTRIX TAPASZ	5x védőtasakban	OGYI-T-20155/03
- FENTANYL SANDOZ MAT 50 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS MÁTRIX TAPASZ	5x védőtasakban	OGYI-T-20155/05
- FENTANYL SANDOZ MAT 75 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS MÁTRIX TAPASZ	5x védőtasakban	OGYI-T-20155/07
- FENTANYL-RATIOPHARM 100 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x védőtasakban	OGYI-T-20282/04
- FENTANYL-RATIOPHARM 25 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x védőtasakban	OGYI-T-20282/01
- FENTANYL-RATIOPHARM 50 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x védőtasakban	OGYI-T-20282/02
- FENTANYL-RATIOPHARM 75 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x védőtasakban	OGYI-T-20282/03
- MATRIFEN 100 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-20288/41
- MATRIFEN 12 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-20288/05
- MATRIFEN 25 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	10x tasakban	OGYI-T-20288/16
- MATRIFEN 25 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-20288/14
- MATRIFEN 50 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-20288/23
- MATRIFEN 75 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-20288/32
- METADON EP 10 MG TABLETTA	50x hdpe tartályban + gyermekbiztos hdpe kupak	OGYI-T-22738/16
- METADON EP 10 MG TABLETTA	90x hdpe tartályban + gyermekbiztos hdpe kupak	OGYI-T-22738/17
- METADON EP 5 MG TABLETTA	10x hdpe tartályban + gyermekbiztos hdpe kupak	OGYI-T-22738/14
- METADON EP 5 MG TABLETTA	50x hdpe tartályban + gyermekbiztos hdpe kupak	OGYI-T-22738/15
- MORFINA CLORIDRATO MONICO 10 MG/1ML SOLUZIONE INIETTABILE	5x1ml	OGYÉI/58951-2/2016/1
- MORFINA CLORIDRATO MONICO 20 MG/1ML SOLUZIONE INIETTABILE	5x1ml	OGYÉI/58951-2/2016/2
- MORPHINUM HYDROCHLORICUM TEVA 10 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	10x1ml ampulla	OGYI-T-12716/01
- MORPHINUM HYDROCHLORICUM TEVA 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	10x1ml ampulla	OGYI-T-12716/03
- MST CONTINUS 10 MG RETARD FILMTABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-02187/01
- MST CONTINUS 100 MG RETARD FILMTABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-02187/05
- MST CONTINUS 30 MG RETARD FILMTABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-02187/03
- MST CONTINUS 60 MG RETARD FILMTABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-02187/04
- OXYCONTIN 10 MG RETARD FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-07166/03
- OXYCONTIN 20 MG RETARD FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-07166/04
- OXYCONTIN 40 MG RETARD FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-07166/05
- OXYCONTIN 80 MG RETARD FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-07166/06

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- OXYNADOR 10 MG/5 MG RETARD TABLETTA	30x1 buboréksomagolásban pvc/pvdc - pet/alu	OGYI-T-23204/04
- OXYNADOR 20 MG/10 MG RETARD TABLETTA	30x1 buboréksomagolásban pvc/pvdc - pet/alu	OGYI-T-23204/14
- OXYNADOR 40 MG/20 MG RETARD TABLETTA	30x1 buboréksomagolásban pvc/pvdc - pet/alu	OGYI-T-23204/24
- RELTEBON 10 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/alu)	OGYI-T-22673/08
- RELTEBON 20 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/alu)	OGYI-T-22673/14
- RELTEBON 40 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/alu)	OGYI-T-22673/20
- RELTEBON 80 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/alu)	OGYI-T-22673/26
- SEVREDOL 10 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22784/01
- TRANSTEC 35 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-08943/02
- TRANSTEC 52,5 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-08944/02
- TRANSTEC 70 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	OGYI-T-08945/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C, R520, R521

EÜ100 8/c.

Támogatott indikációk:

>> Rosszindulatú daganatos betegségek, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- AZACITIDIN SANDOZ 25 MG/ML POR SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben	OGYI-T-23681/01
- AZACITIDINE ACCORD 25 MG/ML POR SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x100mg injekciós üvegben	EU/1/19/1413/001
- AZACITIDINE ONCOEUROPE 25 MG/ML POR SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x100mg injekciós üvegben	OGYI-T-23980/01

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- AZACITIDINE STADA 25 MG/ML POR SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben	OGYI-T-23669/01
- AZACITIDINE ZENTIVA 25 MG/ML POR SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben	OGYI-T-23692/01
- BENDAMUSTINE ONKOGEN 2,5 MG/ML POR OLDATOS INFÚZIÓHOZ VALÓ KONCENTRÁTUMHOZ	5x100mg injekciós üvegben	OGYI-T-22829/04
- DEXAMETHASONE KRKA 20 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-23079/35
- DEXAMETHASONE KRKA 4 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-23079/09
- DEXAMETHASONE KRKA 40 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-23079/47
- DEXAMETHASONE KRKA 8 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-23079/23
- ESTRACYT 140 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x üvegben	OGYI-T-00817/02
- FTORAFUR 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x tartályban	OGYI-T-01001/01
- IMURAN 25 MG FILMTABLETTA	100x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban	OGYI-T-00665/02
- IMURAN 50 MG FILMTABLETTA	100x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban	OGYI-T-00665/01
- INTRONA 10 MILLIÓ NE/ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	1x1ml injekciós üvegben	EU/1/99/127/019
- INTRONA 18 MILLIÓ NE/3 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	1x3ml injekciós üvegben	EU/1/99/127/023
- JAKAVI 10 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/12/773/015
- JAKAVI 15 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/12/773/008
- JAKAVI 20 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/12/773/011
- JAKAVI 5 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/12/773/005
- LEUCOVORIN-TEVA 10 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x30ml injekciós üvegben	OGYI-T-05072/07
- LEUCOVORIN-TEVA 10 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x50ml injekciós üvegben	OGYI-T-05072/09
- LITALIR 500 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x üvegben	OGYI-T-01878/01
- LONSURF 15 MG/6,14 MG FILMTABLETTA	20x buboréksomagolásban	EU/1/16/1096/001
- LONSURF 20 MG/8,19 MG FILMTABLETTA	20x buboréksomagolásban	EU/1/16/1096/004
- LUCRIN PDS DEPOT 11,25 MG POR ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-10040/02
- LUCRIN PDS DEPOT 3,75 MG POR ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-10040/01
- MEDROL 100 MG TABLETTA	20x	OGYI-T-00907/05
- MEDROL 16 MG TABLETTA	50x	OGYI-T-00907/03
- MEDROL 32 MG TABLETTA	20x	OGYI-T-00907/04
- MEDROL 4 MG TABLETTA	100x	OGYI-T-00907/02
- METILPREDNIZOLON-TEVA 125 MG POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x üvegben	OGYI-T-07862/03
- METILPREDNIZOLON-TEVA 40 MG POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ	10x üvegben	OGYI-T-07862/06
- OKTREOTID TEVA 10 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg +1 oldószeres előretöltött fecskendő 1 injekciós üveg adapterrel és 1 biztonsági injekciós tűvel	OGYI-T-23549/01

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- OKTREOTID TEVA 20 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg +1 oldószeres előretöltött fecskendő 1 injekciós üveg adapterrel és 1 biztonsági injekciós tűvel	OGYI-T-23549/02
- OKTREOTID TEVA 30 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg +1 oldószeres előretöltött fecskendő 1 injekciós üveg adapterrel és 1 biztonsági injekciós tűvel	OGYI-T-23549/03
- PREDNISOLON-RICHTER 5 MG TABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-03091/03
- PREDNISOLON-RICHTER 5 MG TABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-03091/01
- PROVERA 100 MG TABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-01242/01
- PROVERA 500 MG TABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-01242/02
- RESELIGO 3,6 MG IMPLANT W AMPULKO-STRZYKAWCE	1x	22925 (PL)
- RESELIGO 3,6 MG IMPLANTAT V NAPOLNJENI INJEKCIJSKI BRIZGI	1x	H/16/02106/001 (SI)
- RESELIGO 3,6 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-22933/01
- SANDOSTATIN LAR 10 MG POR ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg +1 oldószer előretöltött fecskendőben+1 db injekciós üveg adapter+1 injekciós tű	OGYI-T-01723/03
- SANDOSTATIN LAR 20 MG POR ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg +1 oldószer előretöltött fecskendőben+1 db injekciós üveg adapter+1 injekciós tű	OGYI-T-01723/04
- SANDOSTATIN LAR 30 MG POR ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg +1 oldószer előretöltött fecskendőben+1 db injekciós üveg adapter+1 injekciós tű	OGYI-T-01723/05
- SANDOSTATIN 100 MIKROGRAMM/1 ML OLDATOS INJEKCIÓ/INFÚZIÓ	5x1ml ampulla	OGYI-T-01723/01
- SOLU-MEDROL 1000 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg+oldószerüveg	OGYI-T-02245/05
- SOLU-MEDROL 500 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg+oldószerüveg	OGYI-T-02245/04
- SOMATULINE AUTOGEL 120 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-09807/03
- SOMATULINE AUTOGEL 60 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-09807/01
- SOMATULINE AUTOGEL 90 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-09807/02
- STIVARGA 40 MG FILMTABLETTA	84x hdpe tartályban	EU/1/13/858/002
- VIDACULEM 25 MG/ML POR SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben	OGYI-T-23927/01
- XGEVA 120 MG OLDATOS INJEKCIÓ	1x1,7ml injekciós üvegben	EU/1/11/703/001
- ZAVEDOS 10 MG KAPSZULA	1x üvegben	OGYI-T-05125/02
- ZILDALIS 3,6 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-23209/01
- ZITAZONIUM 10 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-03567/01
- ZOLADEX DEPOT 3,6 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-01976/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C

Támogatott indikációk:

NEAK - Ártámogatási Főosztály

EÜ 100 százalékos támogatási kategória

>> Tumoros hypercalcaemia, de kizárólag a készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

>> Malignus tumor következtében fellépő csontmetasztázisok

>> Myeloma multiplex ossealis manifestációi

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek hemato-onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- OSPORIL 4 MG/100 ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x100ml injekciós üvegben	OGYI-T-22277/03
- ZOLEDRONSAV MELIOPHARMA 4 MG/5 ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x injekciós üvegben	OGYI-T-22402/01
- ZOLEDRONSAV PHARMACENTER 4 MG/5 ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x injekciós tartályban	OGYI-T-22350/01
- ZOLEDRONSAV RICHTER CALCIPLUSD KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ ÉS FILMTABLETTA	1x injekciós tartályban +28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23031/01
- ZOLEDRONSAV RICHTER 4 MG/100 ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x pp tartályban	OGYI-T-22232/10
- ZOLEDRONSAV RICHTER 4 MG/5 ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x injekciós tartályban	OGYI-T-22232/01
- ZOLEDRONSAV SANDOZ 4 MG/100 ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x tartályban	OGYI-T-22283/04
- ZOLEDRONSAV TEVA 4 MG/5 ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x5ml injekciós üvegben	EU/1/12/771/004
- ZOLEDRONSAV VIPHARM 4 MG/5 ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x injekciós tartályban	OGYI-T-22273/01
- ZORTILA 4 MG/100 ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x100ml infúziós tartályban	OGYI-T-21928/10
- ZORTILA 4 MG/5 ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x injekciós üvegben	OGYI-T-21928/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C795, C90**Támogatott indikációk:**

>> Csontrendszer érintő események (patológiás csonttörés, a csontok besugárzása, gerincvelő kompresszió vagy csontműtét) megelőzése prosztata tumor csontáttéteiben szenvedő felnőtteknél progresszióig (csontszcintigráfia és CT-vel vagy MR-el detektált változás), amennyiben a betegnél az Eü100 8/d2. pont alapján rendelhető készítmény

>> dokumentáltan ellenjavallt vagy túlérzékenység miatt nem alkalmazható

Támogatott indikációk:

- >> alkalmazása során akut-fázis reakció alakul ki [a kezelés első 3 napján fellépő, lázzal (≥ 38 C) kísért, hát- vagy ízületi vagy csontfájdalom formájában],
- >> alkalmazása nem javasolt súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance < 30 ml/perc) vagy a kreatinin-clearance 30-60 ml/perc esetén, vagy az alkalmazási előírás alapján alkalmazandó csökkentett dózis ellenére romló vesefunkció esetén, vagy,
- >> legalább 3 hónapig történő alkalmazása során a csontfolyamat progrediál.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- XGEVA 120 MG OLDATOS INJEKCIÓ	1x1,7ml injekciós üvegben	EU/1/11/703/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C61, C795

EÜ100 8/e.

Támogatott indikációk:

- >> Szövettanilag igazolt emlőrák csontáttétekkel
- >> Tumoros hypercalcaemia

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- BONESSA 50 MG FILMTABLETTA	90x buboréksomagolásban	OGYI-T-21879/03
- BONESSA 6 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x injekciós üvegben	OGYI-T-21879/05
- HOLMEVIS 50 MG FILMTABLETTA	84x buboréksomagolásban	OGYI-T-21918/03
- HOLMEVIS 6 MG/6 ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x6ml ampulla	OGYI-T-21918/06
- IBANDRONATE PHARMACENTER 50 MG FILMTABLETTA	84x buboréksomagolásban	OGYI-T-22839/02
- IBANDRONIC ACID ACCORD 6 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x6ml injekciós üvegben	EU/1/12/798/002
- OSSICA 50 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-21128/01

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- OSSICA 50 MG FILMTABLETTA	84x buboréksomagolásban	OGYI-T-21128/02
- OSSICA 6 MG/6 ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x injekciós üvegben (i-es típusú)	OGYI-T-21128/06
- XGEVA 120 MG OLDATOS INJEKCIÓ	1x1,7ml injekciós üvegben	EU/1/11/703/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C509, C795

EÜ100 8/f.

Támogatott indikációk:

>> A 8. d) 1., 8. d) 2. és 8) e. pont alatti infúziós kezelések hatásának fenntartására vagy önálló terápiaként - ha a betegnél nem szükséges parenterális biszfoszfonát kezelés, akkor anélkül is

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugárterápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- NEOGRAND 800 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22548/03

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C509, C795, C90

EÜ100 8/g1.

Támogatott indikációk:

>> Hyperprolactinaemia

>> Infertilitás

>> Acromegalia

>> Galaktorrhoea

>> Prolactinoma

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Andrológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészeti-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat
Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.		
Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 MG TABLETTA	30x üvegben	OGYI-T-03720/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D352, E220, E2210, N64, N97

EÜ100 8/g2.

Támogatott indikációk:

>> A 8. g) 1. pont szerinti esetekben, dokumentált bromocriptin rezisztencia, illetve intolerancia esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Andrológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészeti-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat
Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.		
Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- NORPROLAC 150 MIKROGRAMM TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-04871/03
- NORPROLAC 25 MIKROGRAMM TABLETTA ÉS 50 MIKROGRAMM TABLETTA	3x buboréksomagolásban (25 mcg + 50 mcg)	OGYI-T-04871/01
- NORPROLAC 75 MIKROGRAMM TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-04871/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D352, E220, E221, N64, N97

EÜ100 8/h1.

Támogatott indikációk:

Támogatott indikációk:

- >> A megelőző 3 hónapban az e pont alá tartozó gyógyszerrel kezelt beteg részére, illetve azon beteg részére, akinél az EÜ 100 8/h2. pontra besorolt készítményekkel szemben intolerancia áll fenn, vagy az adott készítmények kontraindikáltak
- szerve lokalizált prosztaták sugárkezelésekor:
 - a) közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 6 hónapig,
 - b) magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;
 - lokálisan előrehaladott prosztaták kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztaták esetén:
 - a) ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,
 - b) sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,
 - c) sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;
 - bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitívitáskor (N+);
 - metasztatikus prosztatákban szenvedő betegeknek;
 - kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;
- androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- DECAPEPTYL DEPOT POR ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x előretöltött fecskendőben +1x1 ml oldószer fecskendőben	OGYI-T-05310/01
- DIPHERELINE SR 11,25 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porampulla+oldószerampulla +1 steril buborékcsomagolás (szerelék)	OGYI-T-09082/01
- DIPHERELINE SR 3,75 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porampulla+oldószerampulla	OGYI-T-08169/01
- ELIGARD 22,5 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x tálcás csomagolásban	OGYI-T-10010/03
- ELIGARD 45 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x tálcás csomagolásban	OGYI-T-10010/07
- ELIGARD 7,5 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x tálcás csomagolásban	OGYI-T-10009/03
- LEUPRORELIN PHARMACENTER 11,25 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben tasakban	OGYI-T-23707/01
- LEUPRORELIN SANDOZ 3,6 MG IMPLANTÁTUM	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-21283/01
- LEUPRORELIN SANDOZ 5 MG IMPLANTÁTUM	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-21283/02
- LUCRIN PDS DEPOT 11,25 MG POR ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-10040/02
- LUCRIN PDS DEPOT 3,75 MG POR ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-10040/01
- POLITRATE DEPOT 22,5 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben +oldószeres fecskendő+adapter+tű	OGYI-T-22202/02
- POLITRATE DEPOT 3,75 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben +oldószer tart.előretöltött fecskendő+1 db. illesztő szerkezet+1 db.steril tű	OGYI-T-22202/01
- RESELIGO 10,8 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-22933/03
- RESELIGO 3,6 MG IMPLANT W AMPULKO-STRZYKAWCE	1x	22925 (PL)

Termék név	Kiszereles	Törzskönyvi szám
- RESELIGO 3,6 MG IMPLANTAT V NAPOLNJENI INJEKCIJSKI BRIZGI	1x	H/16/02106/001 (SI)
- RESELIGO 3,6 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-22933/01
- ZILDALIS 3,6 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-23209/01
- ZOLADAX DEPOT 10,8 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-01976/02
- ZOLADAX DEPOT 3,6 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-01976/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C61

EÜ100 8/h2.

Támogatott indikációk:

- >> A megelőző 3 hónapban az EÜ100 8/h1. pont alá tartozó gyógyszerrel nem kezelt beteg (új beteg) részére
- szervre lokalizált prosztaták sugárkezelésekor:
 - a) közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 6 hónapig,
 - b) magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;
 - lokálisan előrehaladott prosztaták kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztaták esetén:
 - a) ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,
 - b) sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,
 - c) sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;
 - bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitívításkor (N+);
 - metasztatikus prosztatákban szenvedő betegeknek;
 - kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;
- androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

Termék név	Kiszereles	Törzskönyvi szám
- ELIGARD 7,5 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x tálcás csomagolásban	OGYI-T-10009/03
- LEUPRORELIN PHARMACENTER 11,25 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben tasakban	OGYI-T-23707/01
- LEUPRORELIN SANDOZ 3,6 MG IMPLANTÁTUM	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-21283/01
- LEUPRORELIN SANDOZ 5 MG IMPLANTÁTUM	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-21283/02
- POLITRATE DEPOT 22,5 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben +oldószeres fecskendő+adapter+tű	OGYI-T-22202/02
- POLITRATE DEPOT 3,75 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben +oldószert tart.előretöltött fecskendő+1 db. illesztő szerkezet+1 db.steril tű	OGYI-T-22202/01
- ZILDALIS 3,6 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-23209/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C61

EÜ100 8/i1.**Támogatott indikációk:**

>> Tamoxifen kezelés után kialakult relapsus vagy tamoxifen intolerancia esetén dokumentált hormonreceptor pozitív emlődagánatos, postmenopauzában levő betegek kezelése

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat

Termék név	Kíszerelés	Törzskönyvi szám
- ANABREST 1 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	OGYI-T-20474/01
- ANABREST 1 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban	OGYI-T-20474/02
- ANASTROZOL STADA 1 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	OGYI-T-20989/05
- ANASTROZOLE ACCORD 1 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban	OGYI-T-21522/10
- ARILLA 1 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban	OGYI-T-20534/03
- ARIMIDEX 1 MG FILMTABLETTA	84x buborékcsomagolásban	OGYI-T-05682/02
- AROMASIN 25 MG BEVONT TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	OGYI-T-07356/01
- ATROCELA 1 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	OGYI-T-22075/06
- ETADRON 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	OGYI-T-21466/03
- ETRUZIL 2,5 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban	OGYI-T-20736/02
- EXEMESTANE PHARMACENTER 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	OGYI-T-21406/01
- EXEMESTANE PHARMACENTER 25 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban	OGYI-T-21406/02
- EXEMIN 25 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc-al)	OGYI-T-21407/04
- FAMOS 2,5 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban	OGYI-T-20836/04
- FEMARA 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	OGYI-T-05712/02
- FLORAZOLE 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	OGYI-T-21799/03
- FUNAMEL 25 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban	OGYI-T-21427/05
- LETROVENA 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	OGYI-T-21587/02
- LETROZOL PHACE 2,5 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	OGYI-T-20889/02
- LETROZOL PHACE 2,5 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban	OGYI-T-20889/04
- LETROZOLE TEVA 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	OGYI-T-21250/02
- LETROZOLE TEVA 2,5 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	OGYI-T-21250/01
- LORTANDA 2,5 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	OGYI-T-22346/02

Termék név	Kiszereles	Törzskönyvi szám
- TEARAN 25 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-21883/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C509

EÜ100 8/i2.

Támogatott indikációk:

>> Postmenopauzában lévő, hormonreceptor pozitív korai emlőrákos beteg adjuváns kezelése

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat

Termék név	Kiszereles	Törzskönyvi szám
- ANABREST 1 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-20474/01
- ANABREST 1 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-20474/02
- ANASTROZOL STADA 1 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-20989/05
- ANASTROZOLE ACCORD 1 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-21522/10
- ARILLA 1 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-20534/03
- ARIMIDEX 1 MG FILMTABLETTA	84x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-05682/02
- ATROCELA 1 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	OGYI-T-22075/06
- ETRUZIL 2,5 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-20736/02
- FAMOS 2,5 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-20836/04
- FEMARA 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-05712/02
- FLORAZOLE 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-21799/03
- LETROVENA 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-21587/02
- LETROZOL PHACE 2,5 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-20889/02
- LETROZOL PHACE 2,5 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-20889/04
- LETROZOLE TEVA 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-21250/02
- LETROZOLE TEVA 2,5 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-21250/01
- LORTANDA 2,5 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-22346/02
- ZITAZONIUM 10 MG TABLETTA	60x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-03567/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C509

EÜ100 8/i3.**Támogatott indikációk:**

>> Postmenopauzában lévő, hormonreceptor pozitív korai emlőrákos beteg adjuváns kezelése standard tamoxifen terápiát követő szekvenciális kezelésként

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ETRUZIL 2,5 MG FILMTABLETTA	90x buboréksomagolásban	OGYI-T-20736/02
- FAMOS 2,5 MG FILMTABLETTA	90x buboréksomagolásban	OGYI-T-20836/04
- FEMARA 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-05712/02
- FLORAZOLE 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-21799/03
- LETROVENA 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-21587/02
- LETROZOL PHACE 2,5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-20889/02
- LETROZOL PHACE 2,5 MG FILMTABLETTA	90x buboréksomagolásban	OGYI-T-20889/04
- LETROZOLE TEVA 2,5 MG FILMTABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-21250/02
- LETROZOLE TEVA 2,5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21250/01
- LORTANDA 2,5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22346/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C509

EÜ100 8/i4.**Támogatott indikációk:**

>> Lokálisan, lokoregionálisan előrehaladott vagy metasztatikus, hormonreceptor pozitív emlőrákban, tamoxifen és aromatase-gátló - vagy ha a beteg korábban tamoxifent nem kapott, aromatase-gátló - kezelés után bekövetkező progresszió (elváltozások méretének 25%-os növekedése, vagy új góccok megjelenése) esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- AFINITOR 10 MG TABLETTA	30x	EU/1/09/538/004
- AFINITOR 5 MG TABLETTA	30x	EU/1/09/538/001

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- EVEROLIMUS KRKA 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23403/07
- EVEROLIMUS KRKA 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23403/04
- EVEROLIMUS ONKOGEN 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban opa/al/pvc/al	OGYI-T-23974/02
- EVEROLIMUS ONKOGEN 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban opa/al/pvc/al	OGYI-T-23974/01
- EVEROLIMUS SANDOZ 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23502/15
- EVEROLIMUS SANDOZ 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23502/09
- EVEROLIMUS VIPHARM 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23574/07
- EVEROLIMUS VIPHARM 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23574/04
- EVEROLIMUS ZENTIVA 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23373/07
- EVEROLIMUS ZENTIVA 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23373/04
- FULVESTRANT APTAPHARMA 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	2x5ml előretöltött fecsekendőben + 2 biztonsági tű	OGYI-T-23754/02
- FULVESTRANT EVER PHARMA 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	2x5ml előretöltött fecsekendőben biztonsági injekciós tűvel	OGYI-T-23440/02
- FULVESTRANT MYLAN 250 MG/5 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x5ml előretöltött fecsekendőben +1 biztonsági tű	EU/1/17/1253/001
- FULVESTRANT PHARMASCIENCE 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x5ml előretöltött fecsekendőben + 1 biztonsági tű	OGYI-T-23742/01
- FULVESTRANT SANDOZ 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	2x5ml előretöltött fecsekendőben	OGYI-T-22907/02
- FULVESTRANT STADA 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ	1x5ml előretöltött fecsekendőben +1 steril, hipodermiás tű	OGYI-T-23569/01
- FULVESTRANT STADA 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ	2x5ml előretöltött fecsekendőben +2 steril, hipodermiás tű	OGYI-T-23569/02
- FULVESTRANT TEVA 250 MG/5 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x5ml előretöltött fecsekendőben	OGYI-T-22998/01
- FULVESTRANT VIPHARM 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x5ml előretöltött fecsekendőben + 1 biztonsági tű	OGYI-T-23747/01
- FULVESTRANT VIPHARM 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	2x5ml előretöltött fecsekendőben + 2 biztonsági tű	OGYI-T-23747/02
- FULVESZTRANT ACCORD 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	2x5ml előretöltött fecsekendőben +2 biztonsági injekciós tű	OGYI-T-23565/01
- IBRANCE 100 MG FILMTABLETTA	21x buboréksomagolásban pvc/opa/al/pvc/al	EU/1/16/1147/012
- IBRANCE 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	21x buboréksomagolásban pvc/pctfe/pvc/al	EU/1/16/1147/003
- IBRANCE 125 MG FILMTABLETTA	21x buboréksomagolásban pvc/opa/al/pvc/al	EU/1/16/1147/014

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- IBRANCE 125 MG KEMÉNY KAPSZULA	21x buboréksomagolásban pvc/pctfe/pvc/al	EU/1/16/1147/005
- IBRANCE 75 MG FILMTABLETTA	21x buboréksomagolásban pvc/opa/al/pvc/al	EU/1/16/1147/010
- IBRANCE 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	21x buboréksomagolásban pvc/pctfe/pvc/al	EU/1/16/1147/001
- IMARSA 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x5ml előretöltött fecskendőben + 1 biztonsági tű	OGYI-T-23743/01
- IMARSA 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	2x5ml előretöltött fecskendőben + 2 biztonsági tű	OGYI-T-23743/02
- KISQALI 200 MG FILMTABLETTA	63x buboréksomagolásban (pctfe/pvc)	EU/1/17/1221/005
- VASTALOMA 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x5ml előretöltött fecskendőben rögzítendő tűvel	OGYI-T-23758/01
- VASTALOMA 250 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	2x5ml előretöltött fecskendőben rögzítendő tűvel	OGYI-T-23758/02
- VERIMMUS 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban (3x10)	OGYI-T-23581/08
- VERIMMUS 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban (6x5)	OGYI-T-23581/09
- VERIMMUS 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban (3x10)	OGYI-T-23581/03
- VERIMMUS 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban (6x5)	OGYI-T-23581/04
- VERZENIOS 100 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban (pctfe/pe/pvc/alu)	EU/1/18/1307/012
- VERZENIOS 150 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban (pctfe/pe/pvc/alu)	EU/1/18/1307/014
- VERZENIOS 50 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban (pctfe/pe/pvc/alu)	EU/1/18/1307/010

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C509

EÜ100 8/j.

Támogatott indikációk:

>> Fej-nyaki területen rosszindulatú daganatok miatt végzett sugárkezeléshez csatlakozó xerostomia kezelése

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Arc-állcsont-szájsebészet	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Fül-orr-gégegyógyászat	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Sugártherápia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- SALAGEN 5 MG FILMTABLETTA	84x buboréksomagolásban	OGYI-T-09137/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, R682

EÜ100 8/k.

Támogatott indikációk:

- >> Az alapbetegséggel összefüggő, tünetekkel járó, lokálisan előrehaladott hormondependens prosztaták kezelésére antiandrogennel
 - a) maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett, vagy
 - b) metasztázis nélküli (M0) betegek esetén szekunder hormonkezelés céljából monoterápiaként emelt dózisban;
- >> Áttétes hormondependens prosztaták kezelésére antiandrogennel maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett;
- >> Adicionális hormonmanipuláció céljából antiandrogennel azon betegeknél, akiknél az adekvát szérumszint tesztoszteron-csökkenést (<50 ng/dl vagy 1,7 nmol/l) nem lehetett elérni gyógyszeres vagy sebészi kasztráció által;
- >> onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ANDROCUR 100 MG TABLETTA	1x50 buboréksomagolásban	OGYI-T-01909/03
- ANDROCUR 100 MG TABLETTA	1x60 buboréksomagolásban	OGYI-T-01909/04
- BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-20589/02
- BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150 MG FILMTABLETTA	90x buboréksomagolásban	OGYI-T-20589/04
- BILUTAMID 50 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-10510/01
- CAPRO 150 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-20472/02
- CAPRO 50 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-20472/05

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C61

EÜ100 8/I1.**Támogatott indikációk:**

>> Hólyagtumor alacsony és közepes kockázatú eseteiben az intravesicalis instilláció céljára a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- EPIRUBICIN ACCORD 2 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	1x25ml ampulla	OGYI-T-21045/03
- EPIRUBICIN-TEVA 2 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	1x100ml injekciós üvegben	OGYI-T-21030/05
- EPIRUBICIN-TEVA 2 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	1x25ml injekciós üvegben	OGYI-T-21030/03
- EPIRUBICIN-TEVA 2 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	1x5ml injekciós üvegben	OGYI-T-21030/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C679

EÜ100 8/I2.**Támogatott indikációk:**

>> Hólyagtumor magas kockázatú eseteiben intravesicalis instilláció céljára és in situ carcinomában a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- BCG CULTURE SSI 2,5X 108 CFU 30 MG	4x	8740
- BCG LIVE USP, SII ONCO-BCG - HOSPTISS	3x	OGYI/41069-2/2016
- BCG-MEDAC POR ÉS OLDÓSZER INTRAVEZIKÁLIS SZUSZPENZIÓHOZ	1x porampulla +1x50 ml oldószerzsák+katéter szereléssel	OGYI-T-09692/02
- ONCO-BCG INJECTION (BCG FOR IMMUNOTHERAPY I.P.- FREEZE-DRIED) - PHARMAROAD	1x3ml	Mfg lic No. 10
- ONKO-BCG 50 PROSZEK I ROZPUSZCZALNIK DO SPRORZĄDZANIA ZAWIESINY DO PODAWANIA DO PÉCHERZA MOCZOWEGO - PHARMAROAD	1x	OGYI/46357-2/2016

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C679

EÜ100 8/n1.**Támogatott indikációk:**

>> Rosszindulatú daganatos betegségben a daganatellenes kezelés (kemoterápia, sugárkezelés) okozta hányás csillapítása

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- CERUCAL 10 MG TABLETTA	50x üvegben	OGYI-T-01047/01
- EMETRON 4 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-05632/02
- EMETRON 8 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-05632/04
- GRANIGEN 1 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-20286/02
- GRANISETRON PHARMACENTER 1 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22207/05
- ONDANSETRON PHARMACENTER 8 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23415/01
- OROSET 8 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22097/01
- OROSET 8 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x fóliacsík	OGYI-T-22097/03
- VOMITA 8 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22513/04

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C, R11

EÜ100 8/n2.**Támogatott indikációk:**

>> Citosztatikus kezelés okozta hányás esetén, amennyiben az a 8. n) 1. pont szerinti gyógyszerekkel nem befolyásolható

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- AKYNZEO 300 MG/0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x buborécsomagolásban	EU/1/15/1001/001
- ALOXI 500 MIKROGRAMM LÁGY KAPSZULA	1x buborécsomagolásban	EU/1/04/306/003
- APREPITANT PHARMACENTER 125 MG KEMÉNY KAPSZULA + APREPITANT PHARMACENTER 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x125mg buborécsomagolásban +2x80 mg buborécsomagolásban	OGYI-T-23605/08
- APREPITANT-Q PHARMA 125 MG KEMÉNY KAPSZULA + APREPITANT-Q PHARMA 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x125 mg + 2x80mg buborécsomagolásban	OGYI-T-23678/07

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C, R11

EÜ100 8/n3.

Támogatott indikációk:

>> Rosszindulatú daganatos betegségben a ciszplatin-alapú erősen emetogén (ciszplatin dózis nagyobb, mint 50 mg/m²) daganatellenes kezelés okozta hányinger és hányás megelőzése és kezelése azokban az esetekben, amikor a korábbi kemoterápia során alkalmazott serotonin-antagonista készítmények hatástalannak bizonyultak, ondansetron injekcióval és per os szteroiddal kombinálva

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- AKYNZEO 300 MG/0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x buborécsomagolásban	EU/1/15/1001/001
- APREPITANT PHARMACENTER 125 MG KEMÉNY KAPSZULA + APREPITANT PHARMACENTER 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x125mg buborécsomagolásban +2x80 mg buborécsomagolásban	OGYI-T-23605/08
- APREPITANT-Q PHARMA 125 MG KEMÉNY KAPSZULA + APREPITANT-Q PHARMA 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x125 mg + 2x80mg buborécsomagolásban	OGYI-T-23678/07
- EMEND 125 MG KEMÉNY KAPSZULA EMEND 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x125mg +2x80 mg	EU/1/03/262/006

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C, R11

EÜ100 8/o.

Támogatott indikációk:

>> Emlő rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

>> Endometrium rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- CACHEXI 40 MG/ML BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x240ml hdpe tartályban 30 ml-es pp adagolópozárral	OGYI-T-24044/01
- MEGACE BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x240ml flakonban	OGYI-T-06416/01
- MEGESIN 160 MG TABLETTA	100x üvegben	OGYI-T-08538/02
- MEGESTROL ACETATE ORAL SUSPENSION 625 MG/5 ML	150 ml	NDC 24979-041-13 (TW)
- MEGESTROL PHARMACENTER 160 MG TABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-23337/02
- MEGYRINA 40 MG/ML BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x240ml hdpe tartályban	OGYI-T-20771/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C509, C541

EÜ100 8/p.

Támogatott indikációk:

- >> Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, az alapbetegség cytostatikus illetve sugaras kezelése alatt vagy ennek előkészítése céljából
- >> Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg eredeti testtömegének 10%-át 3 hónap alatt elvesztette
- >> Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg más szerekekkel 3 hónapig végzett kezelése nem eredményezte a testtömeg szükséges növekedését.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- CACHEXI 40 MG/ML BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x240ml hdpe tartályban 30 ml-es pp adagolópozárral	OGYI-T-24044/01
- MEGACE BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x240ml flakonban	OGYI-T-06416/01
- MEGESIN 160 MG TABLETTA	100x üvegben	OGYI-T-08538/02
- MEGESTROL ACETATE ORAL SUSPENSION 625 MG/5 ML	150 ml	NDC 24979-041-13 (TW)
- MEGESTROL PHARMACENTER 160 MG TABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-23337/02
- MEGYRINA 40 MG/ML BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x240ml hdpe tartályban	OGYI-T-20771/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C, R63, R64

EÜ100 8/sz2.

Támogatott indikációk:

- >> B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) megfelelő biológiai állapot fennállása esetén első vonalbeli kombinációs terápia részeként 25 mg/m² dózisban, vagy monoterápiában, amennyiben kombinációs terápia ellenjavallt
- >> B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) másodvonalbeli kezelés, amennyiben alkiláló ágenszt tartalmazó kezelés ellenére terápiaerezisztencia vagy progresszió igazolható

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- FLUDARA 10 MG FILMTABLETTA	20x buboréksomagolásban és pe tartályban	OGYI-T-08272/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C911

EÜ100 8/t.

Támogatott indikációk:

- >> Kit (CD117) pozitív, nem műthető, illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST) az indikációt igazoló szövettani és a c-kit gén mutációt meghatározó molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Klinikai onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Sugárterápia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- GLIVEC 100 MG FILMTABLETTA	120x buboréksomagolásban (pvc/alu)	EU/1/01/198/011
- GLIVEC 100 MG FILMTABLETTA	120x buboréksomagolásban (pvc/alu)	EU/1/01/198/015
- GLIVEC 400 MG FILMTABLETTA	30x	EU/1/01/198/010
- IMATINIB ACCORD 400 MG FILMTABLETTA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/13/845/020
- IMATINIB ONKOGEN 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-23171/02

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- IMATINIB ONKOGEN 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23171/05
- IMATINIB PHARMACENTER 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban pvc/pvdc/al	OGYI-T-24054/07
- IMATINIB SANDOZ 100 MG FILMTABLETTA	120x buboréksomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	OGYI-T-22936/04
- IMATINIB SANDOZ 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	OGYI-T-22936/06
- IMATINIB STADA 100 MG FILMTABLETTA	120x hdpe tartályban	OGYI-T-22912/02
- IMATINIB STADA 400 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-22912/04
- LATIB 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-23048/01
- LATIB 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23048/02
- NIBIX 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-22801/04
- NIBIX 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22801/07

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

Kijelölt intézet

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Dr. Bugyi István Kórház, Szentes (Csongrád-Csanád megye)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa (Pest megye)
- Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (Budapest)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (Budapest)
- Szent Margit Kórház, Budapest (Budapest)

Kijelölt intézet

- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ100 9/a.**Támogatott indikációk:**

>> Cisztás fibrózis (mucoviscidosis)

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek tüdőgyógyászata	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászati	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- CIFLOXIN 250 MG FILMTABLETTA	10x buboréksomagolásban	OGYI-T-08971/01
- CIFLOXIN 500 MG FILMTABLETTA	10x buboréksomagolásban	OGYI-T-08971/02
- CIFRAN 500 MG FILMTABLETTA	10x buboréksomagolásban	OGYI-T-07560/03
- CIPRINOL 250 MG FILMTABLETTA	10x buboréksomagolásban	OGYI-T-09362/01
- CIPRINOL 500 MG FILMTABLETTA	10x buboréksomagolásban	OGYI-T-09362/02
- CIPROFLOXACIN 1A PHARMA 250 MG FILMTABLETTA	10x buboréksomagolásban	OGYI-T-20213/01
- CIPROFLOXACIN 1A PHARMA 500 MG FILMTABLETTA	10x buboréksomagolásban	OGYI-T-20213/02
- KREON 10.000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-04231/10
- KREON 10.000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	50x hdpe tartályban	OGYI-T-04231/09
- KREON 25.000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	100x hdpe tartályban	OGYI-T-04231/03
- KREON 25.000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	50x hdpe tartályban	OGYI-T-04231/02
- PANGROL 25 000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	100x műanyag tartályban	OGYI-T-07601/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E84

EÜ100 9/b.**Támogatott indikációk:**

>> Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) dokumentált közép súlyos és súlyos tüdőmanifesztáció esetei

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermektüdőgyógyászat	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Tüdőgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- BRAMITOB 300 MG/4 ML OLDAT PORLASZTÁSRA	56x egyadagos tartályban	OGYI-T-20324/03
- BRONCHITOL 40 MG INHALÁCIÓS POR, KEMÉNY KAPSZULA	280x buborékcsoomagolásban +2 inhalátor	EU/1/12/760/002
- COLOBREATHE 1 662 500 NE INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	7x8 buborékcsoomagolásban +1 turbospin porinhalátor	EU/1/11/747/003
- COLOMYCIN 1 000 000 NE POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ, INFÚZIÓHOZ VAGY INHALÁCIÓS OLDATHOZ	10x injekciós üvegben	OGYI-T-10049/01
- COLOMYCIN 2 000 000 NE POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ, INFÚZIÓHOZ VAGY INHALÁCIÓS OLDATHOZ	10x injekciós üvegben	OGYI-T-10049/03
- PULMOZYME 2,5 MG OLDAT PORLASZTÁSRA	30x2,5ml ampulla	OGYI-T-04562/01
- QUINSAIR 240 MG OLDAT PORLASZTÁSRA	56x2,4ml ampulla + 1 porlasztó	EU/1/14/973/001
- TOBI 300 MG/5 ML OLDAT PORLASZTÁSRA	56x5ml ampulla	OGYI-T-08707/01
- TOBRAMYCIN VIA PHARMA 300 MG/5 ML OLDAT PORLASZTÁSRA	56x5ml ampulla	OGYI-T-23038/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E84

Kijelölt intézet
- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Dr. Bugyi István Kórház, Szentes (Csongrád-Csanád megye)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)

Kijelölt intézet

- Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa (Pest megye)
- Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (Budapest)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (Budapest)
- Szent Margit Kórház, Budapest (Budapest)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)
- Zala Megyei Kormányhivatal (Zala megye)

EÜ100 10/a1.**Támogatott indikációk:**

- >> Schizophrenia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
- >> Schizotipias és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermek- és ifjúsági pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- CISORDINOL DEPOT 200 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	10x1ml opc ampullában	OGYI-T-01688/04
- CISORDINOL 10 MG FILMTABLETTA	50x hdpe tartályban	OGYI-T-01688/06
- CISORDINOL 25 MG FILMTABLETTA	50x hdpe tartályban	OGYI-T-01688/07
- FLUANXOL DEPOT 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	10x1ml ampulla	OGYI-T-01106/01
- HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 50 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x1ml ampulla	OGYI-T-03334/04
- HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG TABLETTA	50x buborékcsoomagolásban	OGYI-T-03334/01
- HALOPERIDOL-RICHTER 2 MG/ML BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK	1x10ml üvegben	OGYI-T-03334/02
- HALOPERIDOL-RICHTER 5 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x1ml ampulla	OGYI-T-03334/03

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29

EÜ100 10/a2.**Támogatott indikációk:**

- >> Schizophrenia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
- >> Schizotipias és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Pszichiátria	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ABILIFY MAINTENA 400 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg+oldószerüveg	EU/1/13/882/002
- ABILIFY MAINTENA 400 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	EU/1/13/882/006
- ABILIFY 30 MG TABLETTA	28x	EU/1/04/276/017
- AMISULPRID-RATIOPHARM 200 MG TABLETTA	30x	OGYI-T-20491/01
- AMISULPRID-RATIOPHARM 200 MG TABLETTA	60x	OGYI-T-20491/02
- AMITREX 100 MG TABLETTA	30x	OGYI-T-08231/01
- AMITREX 200 MG TABLETTA	30x	OGYI-T-08231/04
- AMITREX 200 MG TABLETTA	90x	OGYI-T-08231/06
- AMITREX 400 MG FILMTABLETTA	30x	OGYI-T-08231/07
- AMITREX 400 MG FILMTABLETTA	60x	OGYI-T-08231/08
- ARICOGAN 15 MG TABLETTA	60x	OGYI-T-22911/13
- ARICOGAN 30 MG TABLETTA	30x	OGYI-T-22911/14
- ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 MG TABLETTA	56x	EU/1/15/1029/035
- ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 MG TABLETTA	28x1 adagonként perforált	EU/1/15/1029/057
- ARIPIPRAZOL STADA 15 MG TABLETTA	56x	OGYI-T-22898/19
- ARIPIPRAZOL STADA 30 MG TABLETTA	28x	OGYI-T-22898/27
- ARIPIPRAZOLE ORION 15 MG TABLETTA	56x	OGYI-T-22846/06
- ARIPIPRAZOLE ORION 30 MG TABLETTA	28x	OGYI-T-22846/07
- ARIPIPRAZOL-TEVA 15 MG TABLETTA	60x	OGYI-T-22820/15
- ARIPIPRAZOL-TEVA 30 MG TABLETTA	30x	OGYI-T-22820/18
- ARISPPA 10 MG TABLETTA	60x	OGYI-T-22791/16
- ARISPPA 15 MG TABLETTA	60x	OGYI-T-22791/26

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- ARISPPA 30 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22791/33
- ASDUTER 10 MG TABLETTA	28x hdpe tartályban nedvességmegkötő betéttel, csavarmentes kupakkal	OGYI-T-22835/13
- ASDUTER 10 MG TABLETTA	28x hdpe tartályban szilikagél smg nedvességmegkötő betéttel	OGYI-T-22835/02
- ASDUTER 10 MG TABLETTA	56x hdpe tartályban nedvességmegkötő betéttel, csavarmentes kupakkal	OGYI-T-22835/17
- ASDUTER 15 MG TABLETTA	28x hdpe tartályban nedvességmegkötő betéttel, csavarmentes kupakkal	OGYI-T-22835/14
- ASDUTER 15 MG TABLETTA	28x hdpe tartályban szilikagél smg nedvességmegkötő betéttel	OGYI-T-22835/06
- ASDUTER 15 MG TABLETTA	56x hdpe tartályban nedvességmegkötő betéttel, csavarmentes kupakkal	OGYI-T-22835/19
- ASDUTER 30 MG TABLETTA	28x hdpe tartályban szilikagél smg nedvességmegkötő betéttel	OGYI-T-22835/10
- CLOZAPINE GEROT 100 MG TABLETTA	100x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban	OGYI-T-09007/09
- CLOZAPINE GEROT 100 MG TABLETTA	20x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban	OGYI-T-09007/07
- CLOZAPINE GEROT 25 MG TABLETTA	50x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban	OGYI-T-09007/02
- EGOROPAL 100 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecsekendőben + 2 tű	OGYI-T-23987/04
- EGOROPAL 150 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecsekendőben + 2 tű	OGYI-T-23987/05
- EGOROPAL 25 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecsekendőben + 2 tű	OGYI-T-23987/01
- EGOROPAL 50 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecsekendőben + 2 tű	OGYI-T-23987/02
- EGOROPAL 75 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecsekendőben + 2 tű	OGYI-T-23987/03
- EXPLEMED 10 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-22851/05
- EXPLEMED 15 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-22851/08
- EXPLEMED 30 MG TABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-22851/10
- INVEGA 3 MG RETARD TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/395/001
- INVEGA 3 MG RETARD TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/395/041
- INVEGA 6 MG RETARD TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/395/045
- INVEGA 6 MG RETARD TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/395/006
- INVEGA 9 MG RETARD TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/395/049
- INVEGA 9 MG RETARD TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/395/011

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- KETILEPT PROLONG 200 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20056/34
- KETILEPT PROLONG 300 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20056/39
- KETILEPT PROLONG 400 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20056/44
- KETILEPT PROLONG 50 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20056/24
- KETILEPT 150 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20056/11
- KETILEPT 25 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20056/03
- KVENTIAX SR 150 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/58
- KVENTIAX SR 200 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/64
- KVENTIAX SR 300 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/70
- KVENTIAX SR 400 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/82
- KVENTIAX SR 50 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/76
- KVENTIAX 100 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/16
- KVENTIAX 200 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/38
- KVENTIAX 25 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/07
- KVENTIAX 300 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/48
- LEPONEX 100 MG TABLETTA	100x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-00825/07
- LEPONEX 100 MG TABLETTA	100x buboréksomagolásban pvc/pvdc//al	OGYI-T-00825/03
- LEPONEX 100 MG TABLETTA	20x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-00825/05
- LEPONEX 100 MG TABLETTA	20x buboréksomagolásban pvc/pvdc//al	OGYI-T-00825/01
- LEPONEX 25 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-00825/08
- LEPONEX 25 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban pvc/pvdc//al	OGYI-T-00825/04
- OLANZAPIN TEVA 10 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/012
- OLANZAPIN TEVA 10 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/027
- OLANZAPIN TEVA 15 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/016
- OLANZAPIN TEVA 15 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/031
- OLANZAPIN TEVA 20 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/020
- OLANZAPIN TEVA 20 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/035
- OLANZAPIN TEVA 5 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/004

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- OLANZAPIN TEVA 5 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/023
- OLANZAPIN TEVA 7,5 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/008
- OLPINAT 10 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban (opa/al/pvc//al)	OGYI-T-21333/03
- PARNASSAN 10 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21042/04
- PARNASSAN 15 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21042/05
- PARNASSAN 20 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21042/06
- PARNASSAN 5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21042/02
- PARNASSAN 7,5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21042/03
- PARNIDO 3 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23374/02
- PARNIDO 6 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23374/09
- PARNIDO 9 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23374/16
- PERDOX 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/03
- PERDOX 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x100ml üvegben	OGYI-T-10212/06
- PERDOX 2 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/24
- PERDOX 3 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/27
- PERDOX 4 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/30
- PIPRASON 15 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-22863/02
- QUETIAPINE ORION 25 MG FILMTABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-20360/02
- QUETIAPINE-TEVA 100 MG FILMTABLETTA	60x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-20839/04
- QUETIAPINE-TEVA 150 MG FILMTABLETTA	60x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-20839/06
- QUETIAPINE-TEVA 150 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20839/16
- QUETIAPINE-TEVA 200 MG FILMTABLETTA	60x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-20839/08
- QUETIAPINE-TEVA 200 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20839/12
- QUETIAPINE-TEVA 25 MG FILMTABLETTA	60x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-20839/02
- QUETIAPINE-TEVA 300 MG FILMTABLETTA	60x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-20839/10
- QUETIAPINE-TEVA 300 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20839/13
- QUETIAPINE-TEVA 400 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20839/14
- QUETIAPINE-TEVA 50 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20839/11
- REAGILA 1,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	EU/1/17/1209/004

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- REAGILA 3 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	EU/1/17/1209/014
- REAGILA 4,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	EU/1/17/1209/022
- REAGILA 6 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	EU/1/17/1209/030
- RESTIGULIN 10 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22841/03
- RESTIGULIN 15 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22841/06
- RESTIGULIN 30 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22841/08
- RIPEDON 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/03
- RIPEDON 2 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/06
- RIPEDON 3 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/09
- RIPEDON 4 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/12
- RISPERDAL CONSTA 25 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porampulla +1 előretöltött oldószeres fecskendő+adapter+tű	OGYI-T-08812/02
- RISPERDAL CONSTA 37,5 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porampulla +1 előretöltött oldószeres fecskendő+adapter+tű	OGYI-T-08812/04
- RISPERDAL CONSTA 50 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porampulla +1 előretöltött oldószeres fecskendő+adapter+tű	OGYI-T-08812/06
- RISPERDAL 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x100ml üvegben	OGYI-T-08812/07
- RISPERIDON ORION 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x120ml üvegben	OGYI-T-20727/01
- RISPERIDONE TEVA 25 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x ampulla + 2 ml oldószer előretöltött üveg fecskendőben + injekciós üveg adapter + 2 db terumo surguard?3 tű	OGYI-T-23782/01
- RISPERIDONE TEVA 37,5 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x ampulla + 2 ml oldószer előretöltött üveg fecskendőben + injekciós üveg adapter + 2 db terumo surguard?3 tű	OGYI-T-23782/02
- RISPERIDONE TEVA 50 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x ampulla + 2 ml oldószer előretöltött üveg fecskendőben + injekciós üveg adapter + 2 db terumo surguard?3 tű	OGYI-T-23782/03
- RISPONS 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20052/02
- RISPONS 2 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20052/03
- RISPONS 3 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20052/04
- RISPONS 4 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20052/05
- SERDOLECT 12 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-05605/02
- SERDOLECT 16 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-05605/03
- SERDOLECT 20 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-05605/04
- SERDOLECT 4 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-05605/01

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- SEROQUEL XR 200 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-05863/03
- SEROQUEL XR 300 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-05863/04
- SEROQUEL XR 400 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-05863/05
- SEROQUEL XR 50 MG RETARD TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-05863/02
- TALSIAN 100 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23777/02
- TALSIAN 200 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23777/03
- TALSIAN 200 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-23777/04
- TREVICTA 175 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben +2 tű	EU/1/14/971/007
- TREVICTA 263 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben +2 tű	EU/1/14/971/008
- TREVICTA 350 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben +2 tű	EU/1/14/971/009
- TREVICTA 525 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben +2 tű	EU/1/14/971/010
- XEPLION 100 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben +2 tű	EU/1/11/672/004
- XEPLION 150 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben +2 tű	EU/1/11/672/005
- XEPLION 50 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben +2 tű	EU/1/11/672/002
- XEPLION 75 MG RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben +2 tű	EU/1/11/672/003
- YPSILA 40 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20743/04
- YPSILA 60 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20743/06
- YPSILA 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20743/08
- ZELDOX 60 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-08818/06
- ZELDOX 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-08818/07
- ZELDOX 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-08818/08
- ZYPADHERA 210 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x210mg injekciós üvegben +1x3 ml oldószer	EU/1/08/479/001
- ZYPADHERA 300 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x300mg injekciós üvegben +1x3 ml oldószer	EU/1/08/479/002
- ZYPADHERA 405 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x405mg injekciós üvegben +1x3 ml oldószer	EU/1/08/479/003

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29

EÜ100 10/b1.**Támogatott indikációk:**

>> Mánia

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- LITICARB 500 MG TABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-04954/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F301, F302, F311, F312, F316**EÜ100 10/b2.****Támogatott indikációk:**

>> Mánia, a 10/b1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló mániás betegek esetében

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- CISORDINOL DEPOT 200 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	10x1ml opc ampullában	OGYI-T-01688/04
- CISORDINOL 10 MG FILMTABLETTA	50x hdpe tartályban	OGYI-T-01688/06
- CISORDINOL 25 MG FILMTABLETTA	50x hdpe tartályban	OGYI-T-01688/07
- HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-03334/01
- HALOPERIDOL-RICHTER 2 MG/ML BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK	1x10ml üvegben	OGYI-T-03334/02
- HALOPERIDOL-RICHTER 5 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x1ml ampulla	OGYI-T-03334/03

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/b3.**Támogatott indikációk:**

>> Mánia, a 10/b1-10/b2. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Pszichiátria	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- KETILEPT 150 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20056/11
- KETILEPT 25 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20056/03
- KVENTIAX 100 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/16
- KVENTIAX 200 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/38
- KVENTIAX 25 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/07
- KVENTIAX 300 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20471/48
- PERDOX 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/03
- PERDOX 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x100ml üvegben	OGYI-T-10212/06
- PERDOX 2 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/24
- PERDOX 3 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/27
- PERDOX 4 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/30
- QUETIAPINE ORION 25 MG FILMTABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-20360/02
- QUETIAPINE-TEVA 100 MG FILMTABLETTA	60x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-20839/04
- QUETIAPINE-TEVA 150 MG FILMTABLETTA	60x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-20839/06
- QUETIAPINE-TEVA 200 MG FILMTABLETTA	60x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-20839/08
- QUETIAPINE-TEVA 25 MG FILMTABLETTA	60x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-20839/02
- QUETIAPINE-TEVA 300 MG FILMTABLETTA	60x átlátszatlan fehér buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-20839/10
- RIPEDON 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/03
- RIPEDON 2 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/06
- RIPEDON 3 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/09
- RIPEDON 4 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/12
- RISPERDAL 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x100ml üvegben	OGYI-T-08812/07

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- RISPERIDON ORION 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x120ml üvegben	OGYI-T-20727/01
- RISPONS 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20052/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/b4.

Támogatott indikációk:

>> Mánia, a 10/b1-10/b3. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg esetében

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Pszichiátria	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ABILIFY 30 MG TABLETTA	28x	EU/1/04/276/017
- ARICOGAN 15 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22911/13
- ARICOGAN 30 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22911/14
- ARIPIPAZOL SANDOZ 15 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/15/1029/035
- ARIPIPAZOL SANDOZ 30 MG TABLETTA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/15/1029/057
- ARIPIPAZOL STADA 15 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-22898/19
- ARIPIPAZOL STADA 30 MG TABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-22898/27
- ARIPIPAZOLE ORION 15 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-22846/06
- ARIPIPAZOLE ORION 30 MG TABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-22846/07
- ARIPIPAZOL-TEVA 15 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22820/15
- ARIPIPAZOL-TEVA 30 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22820/18
- ARISPPA 10 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22791/16
- ARISPPA 15 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22791/26
- ARISPPA 30 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22791/33
- ASDUTER 10 MG TABLETTA	28x hdpe tartályban nedvességmegkötő betéttel, csavarmentes kupakkal	OGYI-T-22835/13
- ASDUTER 10 MG TABLETTA	28x hdpe tartályban szilikagél smg nedvességmegkötő betéttel	OGYI-T-22835/02

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- ASDUTER 10 MG TABLETTA	56x hdpe tartályban nedvességmegkötő betéttel, csavarmentes kupakkal	OGYI-T-22835/17
- ASDUTER 15 MG TABLETTA	28x hdpe tartályban nedvességmegkötő betéttel, csavarmentes kupakkal	OGYI-T-22835/14
- ASDUTER 15 MG TABLETTA	28x hdpe tartályban szilikagél smg nedvességmegkötő betéttel	OGYI-T-22835/06
- ASDUTER 15 MG TABLETTA	56x hdpe tartályban nedvességmegkötő betéttel, csavarmentes kupakkal	OGYI-T-22835/19
- ASDUTER 30 MG TABLETTA	28x hdpe tartályban szilikagél smg nedvességmegkötő betéttel	OGYI-T-22835/10
- EXPLEMED 10 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-22851/05
- EXPLEMED 15 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-22851/08
- EXPLEMED 30 MG TABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-22851/10
- OLANZAPIN TEVA 10 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/012
- OLANZAPIN TEVA 10 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/027
- OLANZAPIN TEVA 15 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/016
- OLANZAPIN TEVA 15 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/031
- OLANZAPIN TEVA 20 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/020
- OLANZAPIN TEVA 20 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/035
- OLANZAPIN TEVA 5 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/004
- OLANZAPIN TEVA 5 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/023
- OLANZAPIN TEVA 7,5 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/07/427/008
- OLPINAT 10 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban (opa/al/pvc//al)	OGYI-T-21333/03
- PARNASSAN 10 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21042/04
- PARNASSAN 15 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21042/05
- PARNASSAN 20 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21042/06
- PARNASSAN 5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21042/02
- PARNASSAN 7,5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-21042/03
- PIPRASON 15 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-22863/02
- RESTIGULIN 10 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22841/03
- RESTIGULIN 15 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22841/06

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- RESTIGULIN 30 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22841/08
- YPSILA 40 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20743/04
- YPSILA 60 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20743/06
- YPSILA 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20743/08
- ZELDOX 60 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-08818/06
- ZELDOX 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-08818/07
- ZELDOX 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-08818/08

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/c1.

Támogatott indikációk:

>> Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- CISORDINOL 10 MG FILMTABLETTA	50x hdpe tartályban	OGYI-T-01688/06
- CISORDINOL 25 MG FILMTABLETTA	50x hdpe tartályban	OGYI-T-01688/07
- HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-03334/01
- HALOPERIDOL-RICHTER 2 MG/ML BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK	1x10ml üvegben	OGYI-T-03334/02
- HALOPERIDOL-RICHTER 5 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x1ml ampulla	OGYI-T-03334/03

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F060, F061, F062

EÜ100 10/c2.

Támogatott indikációk:

>> Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar, a 10/c1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
-----------	---------------	-------------

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- PERDOX 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/03
- PERDOX 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x100ml üvegben	OGYI-T-10212/06
- PERDOX 2 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/24
- PERDOX 3 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/27
- PERDOX 4 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/30
- RIPPEDON 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/03
- RIPPEDON 2 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/06
- RIPPEDON 3 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/09
- RIPPEDON 4 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/12
- RISPERDAL 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x100ml üvegben	OGYI-T-08812/07
- RISPERIDON ORION 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x120ml üvegben	OGYI-T-20727/01
- RISPONS 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20052/02
- RISPONS 2 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20052/03
- RISPONS 3 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20052/04
- RISPONS 4 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20052/05

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F060, F061, F062**EÜ100 10/d1.****Támogatott indikációk:**

>> Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelése

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyerme- és ifjúsági pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- CISORDINOL 10 MG FILMTABLETTA	50x hdpe tartályban	OGYI-T-01688/06

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- CISORDINOL 25 MG FILMTABLETTA	50x hdpe tartályban	OGYI-T-01688/07
- HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-03334/01
- HALOPERIDOL-RICHTER 2 MG/ML BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK	1x10ml üvegben	OGYI-T-03334/02
- HALOPERIDOL-RICHTER 5 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x1ml ampulla	OGYI-T-03334/03

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F70, F71, F72, F73, F78, F79

EÜ100 10/d2.

Támogatott indikációk:

>> Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelésére a 10. d) 1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermek- és ifjúsági pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- PERDOX 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/03
- PERDOX 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x100ml üvegben	OGYI-T-10212/06
- PERDOX 2 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/24
- PERDOX 3 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/27
- PERDOX 4 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-10212/30
- RIPEDON 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/03
- RIPEDON 2 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/06
- RIPEDON 3 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/09
- RIPEDON 4 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20691/12
- RISPERDAL 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x100ml üvegben	OGYI-T-08812/07
- RISPERIDON ORION 1 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x120ml üvegben	OGYI-T-20727/01
- RISPONS 1 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-20052/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F70, F71, F72, F73, F78, F79

EÜ100 11.**Támogatott indikációk:**

>> Epilepszia

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermeckneurologia	írhat
Megkötés nélkül	Neurológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermeckneurologia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényessége ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- CONVULEX 300 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ LÁGY KAPSZULA	100x buboréksomagolásban (pvc/pvdc/al)	OGYI-T-01112/06
- CONVULEX 300 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ LÁGY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban (pvc/pvdc/al)	OGYI-T-01112/05
- CONVULEX 50 MG/ML SZIRUP GYERMEKEKNEK	1x100ml üvegben	OGYI-T-01114/01
- DIPHEDAN TABLETTA	25x barna üvegpalackban	OGYI-T-12750/01
- NEUROTOP 200 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-01863/01
- NEUROTOP 600 MG RETARD TABLETTA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-01479/02
- TEGRETOL 100 MG/5 ML BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x100ml üvegben	OGYI-T-05833/04
- TEGRETOL 200 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-05833/06
- TEGRETOL 200 MG TABLETTA	50x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al super triplex	OGYI-T-05833/07

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G409**EÜ100 12.****Támogatott indikációk:**

>> Amyotrophiás lateral sclerosis klinikailag és electromyographias (EMG) vizsgálattal dokumentált eseteiben

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
------------	------------	------------------

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- RILUTEK 50 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/96/010/001
- SCLEFIC 50 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban pvc//al	OGYI-T-20837/06

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G122

EÜ100 13/a1.

Támogatott indikációk:

>> Diabetes insipidus

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje korlátlan.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- MINIRIN 0,1 MG/ML OLDATOS ORRSPRAY	1x5ml üvegben	OGYI-T-05644/11
- MINURIN 0,1 MG/ML OLDATOS ORRSPRAY	1x5ml	58-566 (ES)
- NOCUTIL 0,1 MG/ML OLDATOS ORRSPRAY	1x5ml üvegben	OGYI-T-06796/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E232

EÜ100 13/a2.

Támogatott indikációk:

>> Diabetes insipidus, desmopressin hatóanyagú orrcsepp igazolt hatástalansága esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje korlátlan.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- MINIRIN 0,1 MG TABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-05644/12
- MINIRIN 0,2 MG TABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-05644/01
- NOCUTIL 0,1 MG TABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-20088/01

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- NOCUTIL 0,2 MG TABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-20088/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E232

EÜ100 14.

Támogatott indikációk:

>> Velezületett mellékvese hypoplasia 18 éves korig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ASTONIN 0,1 MG TABLETTA	100x pp tartályban	OGYI-T-01533/01
- CORTEF 10 MG TABLETTA	100x hdpe tartályban	OGYI-T-09856/02
- PREDNISOLON-RICHTER 5 MG TABLETTA	100x buboréksomagolásban	OGYI-T-03091/03
- PREDNISOLON-RICHTER 5 MG TABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-03091/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Q891

EÜ100 15/a.

Támogatott indikációk:

>> Kortikoszteroid kezelésre rezisztens gyermekkori nephrosis szindróma esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- SANDIMMUN NEORAL 10 MG LÁGY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/02
- SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x50ml üvegben	OGYI-T-04200/01
- SANDIMMUN NEORAL 25 MG LÁGY KAPSZULA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/03
- SANDIMMUN NEORAL 50 MG LÁGY KAPSZULA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/04

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): N04

EÜ100 15/b.

Támogatott indikációk:

>> Kortikoszteroid kezelésre rezisztens nephrosis szindróma esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Allergológia és klinikai immunológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- SANDIMMUN NEORAL 10 MG LÁGY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/02
- SANDIMMUN NEORAL 100 MG LÁGY KAPSZULA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/05
- SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x50ml üvegben	OGYI-T-04200/01
- SANDIMMUN NEORAL 25 MG LÁGY KAPSZULA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/03
- SANDIMMUN NEORAL 50 MG LÁGY KAPSZULA	50x buboréksomagolásban	OGYI-T-04200/04

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): N04

EÜ100 16.

Támogatott indikációk:

>> Veszélyesített aminosav anyagcserezavarok

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- LOPROFIN ALACSONY FEHÉRJE TARTALMÚ TEJHELYETTESÍTŐ ITAL	27x200 ml	T/3020/2021
- MAYDIS AMYLUM	1000 g	Ph. Hg. VIII.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- MILUPA LP DRINK	6x400 g	T/2680/2019
- MILUPA LP FRUITY ALACSONY FEHÉRJETART KÖRTÉS ÍZESÍTÉSŰ PÉP	6x300 g	2932/2020
- MILUPA LP-FRUITY ALACSONY FEHÉRJETART ALMÁS-BANÁNOS ÍZESÍTÉSŰ PÉP	6x300 g	T/2465/2018
- SOLANI AMYLUM	1000 g	Ph. Hg. VIII.
- TRITICI AMYLUM	1000 g	Ph. Hg. VIII.
- VITAFLO PROZERO (18X250 ML) SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	18x250 ml	T/2827/2019
- VITAFLO PROZERO (6X1 L) SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	6x1 l	T/2828/2019

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E7000, E7010, E7020, E7080, E7100, E7110, E7120, E7200, E7210, E7220, E7230, E7240, E7250, E7280, E7290

EÜ100 17.

Támogatott indikációk:

>> Phenylketonuria dokumentált esetei

>> Hyperphenylalaninaemia dokumentált esetei

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekegyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekegyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- COMIDA PKU A FORMULA+LCP SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	400 g	T/2893/2020
- COMIDA PKU B PINA COLADA SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x14,3 g	T/2891/2020
- COMIDA PKU B SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x13,7 g	T/2890/2020
- MEVALIA PKU MOTION RED FRUITS 20 SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x 140ml	T/2895/2020
- MEVALIA PKU MOTION TROPICAL 20 SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x 140ml	T/2327/2017
- MEVALIA PKU MOTION YELLOW FRUITS 20 SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x 140ml	T/2795/2019
- P-AM MATERNAL SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	500 g	T/2534/2018
- PKU ANAMIX FIRST SPOON SEMLEGES ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x12,5g	T/2811/2019
- PKU ANAMIX INFANT SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	400 g	T/2768/2019
- PKU ANAMIX JUNIOR LQ BOGYÓS GYÜMÖLCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	36x125ml	T/2435/2018
- PKU ANAMIX JUNIOR LQ NARANCS ÍZŰ	36x125ml	T/2433/2018
- PKU ANAMIX JUNIOR POR BOGYÓS GYÜMÖLCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x36g	T/2455/2018
- PKU ANAMIX JUNIOR POR CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x36g	T/2466/2018
- PKU ANAMIX JUNIOR POR ÍZESÍTETLEN SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x36g	T/2388/2018

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- PKU ANAMIX JUNIOR POR NARANCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x36g	T/2453/2018
- PKU ANAMIX JUNIOR POR VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x36g	T/2452/2018
- PKU LOPHLEX LQ 10 JUICY BOGYÓS GYÜMÖLCS SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	60x62,5ml	T/2572/2018
- PKU LOPHLEX LQ 10 JUICY NARANCS SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	60x62,5ml	T/2571/2018
- PKU LOPHLEX LQ 20 JUICY BOGYÓS GYÜMÖLCS SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x125 ml	T/2440/2018
- PKU LOPHLEX LQ 20 JUICY CITRUS SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x125 ml	T/2441/2018
- PKU LOPHLEX LQ 20 JUICY NARANCS SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x125 ml	T/2442/2018
- PKU LOPHLEX LQ 20 JUICY TRÓPUSI SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x125 ml	T/2443/2018
- PKU LOPHLEX POR BOGYÓS GYÜMÖLCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x28 g (840 g)	T/3131/2022
- PKU LOPHLEX POR ÍZESÍTÉS NÉLKÜLI SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x28 g (840 g)	T/3130/2022
- PKU LOPHLEX POR NARANCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x28 g (840 g)	T/3129/2022
- PKU LOPHLEX SELECT LQ BARACK TEA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x125 ml	T/3084/2022
- PKU LOPHLEX SELECT LQ MENTA TEA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x125 ml	T/3085/2022
- PKU LOPHLEX SENSATION BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK	12x3x109g (kartondoboz)	T/2463/2018
- PKU SYNERGY CITRUS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x33g	T/3000/2021
- VITAFLO PKU AIR 15 BOGYÓS GYÜMÖLCS ÍZŰ	30x130 ml	T/2234/2017
- VITAFLO PKU AIR 15 CITRUS ÍZŰ	30x130 ml	1860
- VITAFLO PKU AIR 15 KARIBI GYÜMÖLCS ÍZŰ	30x130 ml	T/2232/2017
- VITAFLO PKU AIR 15 KÁVÉ ÍZŰ	30x130 ml	1862
- VITAFLO PKU AIR 15 MANGÓ ÍZŰ	30x130 ml	T/2230/2017
- VITAFLO PKU AIR 20 BOGYÓS GYÜMÖLCS ÍZŰ	30x174 ml	T/2235/2017
- VITAFLO PKU AIR 20 CITRUS ÍZŰ	30x174 ml	1861
- VITAFLO PKU AIR 20 KARIBI GYÜMÖLCS ÍZŰ	30x174 ml	T/2233/2017
- VITAFLO PKU AIR 20 KÁVÉ ÍZŰ	30x174 ml	1863
- VITAFLO PKU AIR 20 MANGÓ ÍZŰ	30x174 ml	T/2231/2017
- VITAFLO PKU COOLER 10 ERDEI GYÜMÖLCS ÍZŰ	30x87 ml	1703
- VITAFLO PKU COOLER 10 MÁLNA ÍZŰ	30x87 ml	1700
- VITAFLO PKU COOLER 10 MANGÓ ÍZŰ	30x87 ml	T/2287/2017
- VITAFLO PKU COOLER 10 NARANCS ÍZŰ	30x87 ml	1697
- VITAFLO PKU COOLER 15 ERDEI GYÜMÖLCS ÍZŰ	30x130 ml	1704
- VITAFLO PKU COOLER 15 MÁLNA ÍZŰ	30x130 ml	1701
- VITAFLO PKU COOLER 15 MANGÓ ÍZŰ	30x130 ml	T/2288/2017
- VITAFLO PKU COOLER 15 NARANCS ÍZŰ	30x130 ml	1698
- VITAFLO PKU COOLER 20 ERDEI GYÜMÖLCS ÍZŰ	30x174 ml	1705
- VITAFLO PKU COOLER 20 MÁLNA ÍZŰ	30x174 ml	1702
- VITAFLO PKU COOLER 20 MANGÓ ÍZŰ	30x174 ml	T/2289/2017
- VITAFLO PKU COOLER 20 NARANCS ÍZŰ	30x174 ml	1699
- VITAFLO PKU COOLER 20 NATUR ÍZŰ	30x174 ml	1696
- VITAFLO PKU EXPRESS 15 CITROM ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x25 g	T/2994/2021
- VITAFLO PKU EXPRESS 20 CITROM ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x34 g	T/2995/2021
- VITAFLO PKU EXPRESS 20 NARANCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x34 g	T/2997/2021

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- VITAFLO PKU EXPRESS 20 NATÚR ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x34 g	T/2996/2021
- VITAFLO PKU EXPRESS 20 TRÓPUSI GYÜMÖLCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x34 g	T/2998/2021
- VITAFLO PKU GEL MÁLNA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x24 g	T/2640/2019
- VITAFLO PKU GEL NARANCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x24 g	T/2637/2019
- VITAFLO PKU GEL NATUR ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x24 g	T/2646/2019
- VITAFLO PKU START SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x400 g	T/2708/2019

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E700, E701

EÜ100 18.

Támogatott indikációk:

>> Igazolt és dokumentált galactosaemia, 6 éves korig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai genetika	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- HUMANA SL TEJMENTES SPECIÁLIS - GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT - TÁPSZER ÚJSZÜLÖTT KÓRTÓL	500 g (2 x 250 g) (kombinált fólia/kartondoboz)	T/2353/2018

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E742

EÜ100 19.

Támogatott indikációk:

>> Szövettanilag igazolt és dokumentált glutén túlérzékenység, 18 éves korig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermekek gasztroenterológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
------------	------------	------------------

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- MAYDIS AMYLUM	1000 g	Ph. Hg. VIII.
- SOLANI AMYLUM	1000 g	Ph. Hg. VIII.

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K900

EÜ100 20.

Támogatott indikációk:

>> Glucose-galactose malabsorptio

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gastroenterológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- FRUCTOSUM	1000 g	Ph. Hg. VIII.

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E743

EÜ100 21/a.

Támogatott indikációk:

>> Anyatej hiánya esetén, annak pótlására 2500 g testsúly alatti kis testtömegű újszülöttnak, illetve koraszülöttnak a 3000 g testsúly eléréséig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje korlátlan.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- BEBA KORASZÜLÖTTEKNEK SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	400 g	T/2801/2019
- MILUMIL NENATAL TÁPSZER	400 g fémdobozban	T/2784/2019

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): P071

EÜ100 22.**Támogatott indikációk:**

>> Terhes anyák részére, szerológiai igazolt toxoplasmosisban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Infektológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészeti-nőgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ROVAMYCINE 1,5 MILLIÓ NE FILMTABLETTA	16x buboréksomagolásban	OGYI-T-01237/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): B589

EÜ100 23/a.**Támogatott indikációk:**

>> Krónikus aktív hepatitis B kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gastroenterológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Infektológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Trópusi betegségek	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- BARACLUDE 0,05 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x210ml palackban	EU/1/06/343/005
- BARACLUDE 0,5 MG FILMTABLETTA	30x1 buboréksomagolásban	EU/1/06/343/003
- ENTECAVIR ALVOGEN 0,5 MG FILMTABLETTA	30x1 buboréksomagolásban	OGYI-T-23197/01
- ENTECAVIR MYLAN 0,5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/17/1227/002
- ENTECAVIR MYLAN 0,5 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/17/1227/001
- ENTECAVIR PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LTD 0,5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23649/02
- ENTECAVIR TEVA 0,5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23216/01
- ENTECAVIR TEVA 0,5 MG FILMTABLETTA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	OGYI-T-23216/03
	(pvc/pvdc//al)	

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- ENTECAVIR TEVA 0,5 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban (pvc/pvdc//al)	OGYI-T-23216/05
- ENTECAVIR ONKOGEN 0,5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23397/01
- INTRONA 10 MILLIÓ NE/ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	1x1ml injekciós üvegben	EU/1/99/127/019
- INTRONA 18 MILLIÓ NE/3 ML OLDATOS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	1x3ml injekciós üvegben	EU/1/99/127/023
- PEGASYS 180 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	4x előretöltött fecsekendőben +4 injekciós tű	EU/1/02/221/008
- TENOFERA 245 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23642/01
- TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/16/1129/001
- TENOFOVIR ONKOGEN 245 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	OGYI-T-23823/01
- TENOFOVIR TEVA 245 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-22903/01
- VIROFOB 245 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23008/01
- ZEFFIX 100 MG FILMTABLETTA	28x	EU/1/99/114/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): B180, B181

Kijelölt intézet
- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat (Nógrád megye)
- Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (Budapest)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Karolina Kórház és Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár (Győr-Moson-Sopron megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Magyar Imre Kórház, Ajka (Veszprém megye)
- Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger (Heves megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa (Pest megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (Győr-Moson-Sopron megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)

Kijelölt intézet

- Tolna Megyei Balassa János Kórház (Tolna megye)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ100 24.**Támogatott indikációk:**

>> Szövettanilag igazolt, más gyógyszeres kezelésre nem reagáló endometriosis

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Szülészeti-nőgyógyászat	írhat

Termék név	Készítés	Törzskönyvi szám
- DECAPEPTYL DEPOT POR ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x előretöltött fecskendőben +1x1 ml oldószer fecskendőben	OGYI-T-05310/01
- DIPHERELINE SR 3,75 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porampulla+oldószerampulla	OGYI-T-08169/01
- LUCRIN PDS DEPOT 3,75 MG POR ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-10040/01
- RESELIGO 3,6 MG IMPLANT W AMPULKO-STRZYKAWCE	1x	22925 (PL)
- RESELIGO 3,6 MG IMPLANTAT V NAPOLNJENI INJEKCIJSKI BRIZGI	1x	H/16/02106/001 (SI)
- RESELIGO 3,6 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-22933/01
- ZILDALIS 3,6 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-23209/01
- ZOLADAX DEPOT 3,6 MG IMPLANTÁTUM ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-01976/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): N809

Kijelölt intézet

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 25.**Támogatott indikációk:**

>> Hereditær angiooedema akut rohamainak kezelésére

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Allergológia és klinikai immunológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Allergológia és klinikai immunológia	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Belgyógyászat	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Bőrgyógyászat	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Fül-orr-gégegyógyászat	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje korlátlan.

Termék név	Készletelés	Törzskönyvi szám
- BERINERT 500 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ VAGY INFÚZIÓHOZ	1x porampulla+oldószerampulla	OGYI-T-05953/01
- FIRAZYR 30 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben +1 injekciós tű	EU/1/08/461/001
- ICATIBANT ACCORD 30 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x3ml előretöltött fecskendőben + 1 injekciós tű	EU/1/21/1567/001
- ICATIBANT STADA 30 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x3ml előretöltött fecskendőben +1 tű	OGYI-T-23952/01
- ICATIBANT TEVA 30 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x3ml előretöltött fecskendőben + 1 injekciós tű	OGYI-T-23910/01
- RUCONEST 2100 EGYSÉG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg+oldószerüveg +2 injekciós üveg adapter+1 fecskendő+1 infúziós szerelék tűvel+2 alkoholos törlő+1 steril, nem szövött törlő+1 öntapadó ragtapasz	EU/1/10/641/002
- RUCONEST 2100 EGYSÉG POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben	EU/1/10/641/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D841**Kijelölt intézet**

- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)

EÜ100 27.**Támogatott indikációk:**

>> Igazolt Paget kór kezelése, két évente egy alkalommal

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- ACLASTA 5 MG OLDATOS INFÚZIÓ	1x100ml	EU/1/05/308/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M889

EÜ100 28.**Támogatott indikációk:**

>> Perzisztáló allergiás asthma bronchiale kiegészítő kezelése céljából - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrendek (felnőttkori asthma bronchiale és gyermekkori asthma bronchiale) alapján - a következő feltételek teljesülése esetén:

- IgE-szint > 76 NE/ml és az IgE-szint nem haladja meg az alkalmazási előírás szerinti maximális értéket,
- perenniális inhalatív allergénnel szembeni pozitív bőrpróba vagy specifikus IgE kimutatása a szérumban,
- szisztémás szteroid tartós alkalmazása ellenére az asthma nem kontrollált vagy nagy dóziszú ICS+LABA alkalmazása ellenére gyakoriak a szisztémás szteroidot igénylő exacerbációk ($\geq 4/\text{év}$),
- FEV1 < ref. 80%-a.

Az anti-IgE-kezelés megkezdését követően évente értékelni kell a kezelés hatását és az anti-IgE-kezelés kizárólag akkor folytatható, ha az utolsó egy év során szisztémás szteroidot igénylő exacerbáció legfeljebb 2 alkalommal fordult elő. Anti-IgE és anti-IL5 egyidejűleg nem alkalmazható.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermecktüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermecktüdőgyógyászat	javaslatra írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 4 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- XOLAIR 150 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	EU/1/05/319/008

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J4500

Kijelölt intézet

- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó (Csongrád-Csanád megye)

Kijelölt intézet

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Mátrai Gyógyintézet (Heves megye)
- Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Tüdőgyógyintézet Törökbálint (Pest megye)

EÜ100 29.**Támogatott indikációk:**

>> Rosszindulatú daganatos megbetegedéshez társuló, tünetekkel járó, nem kuratív célú kemoterápiával összefüggő anémia kezelése - az alkalmazott készítmény jóváhagyott indikációinak figyelembevételével - megfelelő étrend-kiegészítés és szükség esetén parenterális vaspótlás mellett a hemoglobin (Hgb) szint < 10 g/dl a kemoterápia befejezését követő negyedik hétig, amennyiben a hemoglobin szint a 12 g/dl értéket meghaladja, vagy a kezelés nyolcadik hetére a hemoglobinszint emelkedése a kiindulási értékhez képest < 1 g/dl, és a retikulocita szám 40000 sejt/mikroliter alatt marad, az ESA (erythropoiesis stimulating agent) kezelést meg kell szakítani - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján és az adott gyógyszer alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakr.	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakr.	Klinikai onkológia	írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakr.	Haematológia	javasolhat és írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- BINOCRIT 30000 NE/0,75 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x0,75ml előretöltött fecskendőben +bizt.tűvédővel	EU/1/07/410/049
- BINOCRIT 40000 NE/1,0 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x1,0ml előretöltött fecskendőben +bizt.tűvédővel	EU/1/07/410/051
- BINOCRIT 40000 NE/1,0 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	4x1,0ml előretöltött fecskendőben +bizt.tűvédővel	EU/1/07/410/055
- EPORATIO 20000 NE/1 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	4x1ml előretöltött fecskendőben biztonsági tűvel	EU/1/09/573/038
- EPORATIO 20000 NE/1 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	4x1ml előretöltött fecskendőben biztonsági védőeszköz nélkül	EU/1/09/573/019
- EPORATIO 30000 NE/1 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	4x1ml előretöltött fecskendőben biztonsági tűvel	EU/1/09/573/041
- EPORATIO 30000 NE/1 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	4x1ml előretöltött fecskendőben biztonsági védőeszköz nélkül	EU/1/09/573/025

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- EPORATIO 30000 NE/1 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	4x1ml előretöltött fecskendőben biztonsági védőeszközzel	EU/1/09/573/026
- RETACRIT 40000 NE/1,0 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	4x előretöltött fecskendőben	EU/1/07/431/024

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C

EÜ100 30/a.

Támogatott indikációk:

>> Dializált beteg részére, ha lágyrészmeszesedése, 1,86 mmol/l-nél magasabb foszfor szintje, 2,5 mmol/l-nél magasabb korrigált kalcium szintje, 4,4 mmol/2-l-nél magasabb a kalcium és foszfor szorzata, 150-300 pg/ml közötti intakt parathormon szintje van, a csontanyagcsere-zavar, illetve életet veszélyeztető lágyrészmeszesedés megelőzésére

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Nephrológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje korlátlan.

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- FOSRENOL 1000 MG RÁGÓTABLETTA	90x hdpe tartályban	OGYI-T-20336/04
- RENVELA 2,4 G POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	60x tasakban	EU/1/09/521/006
- RENVELA 800 MG FILMTABLETTA	180x hdpe tartályban (külső doboz nélkül)	EU/1/09/521/003
- SEVELAMER CARBONATE WINTHROP 800 MG FILMTABLETTA	180x hdpe tartályban	EU/1/14/952/001
- SEVELAMER MENSANA PHARMA 800 MG FILMTABLETTA	180x hdpe tartályban	OGYI-T-22680/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Z491

Kijelölt intézet

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- FMC Dialízis Center Egészségügyi Kft., Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tataháza (Komárom-Esztergom megye)
- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (Budapest)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)

EÜ100 31/a.**Támogatott indikációk:**

>> A felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában előzetesen szupportív szerekkel (antikoaguláns, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor tesztrel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kalcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Kardiológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Tüdőgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ADCIRCA 20 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/08/476/006
- REVATIO 20 MG FILMTABLETTA	90x buboréksomagolásban	EU/1/05/318/001
- TADALAFIL AOP 20 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	OGYI-T-23499/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I2700, J991

Kijelölt intézet

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 31/b.**Támogatott indikációk:**

>> A felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában, amennyiben az EÜ100 31/a. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer 3 hónapos alkalmazása során nem érték el a megfelelő terápiás hatást, a remisszió fennállásáig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Kardiológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- AMBRISANTAN AZR 10 MG FILMTABLETTA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban fehér pvc/pvdc//al	OGYI-T-24019/03
- AMBRISANTAN AZR 5 MG FILMTABLETTA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban fehér pvc/pvdc//al	OGYI-T-24019/01

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- OPSUMIT 10 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/13/893/002
- STAYVEER 125 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/13/832/002
- STAYVEER 125 MG FILMTABLETTA	56x hdpe palackban	EU/1/13/832/006
- STAYVEER 62,5 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/13/832/001
- STAYVEER 62,5 MG FILMTABLETTA	56x hdpe palackban	EU/1/13/832/005
- VOLIBRIS 10 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/08/451/004
- VOLIBRIS 5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/08/451/002

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I2700, M3480

Kijelölt intézet

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 31/c.

Támogatott indikációk:

- >> Idiopátiás pulmonalis arteriális hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriális hipertóniában előzetesen szupportív szerekekkel (antikoaguláns, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kalcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben, 12-18 éves kor között a remisszió fennállásáig
- >> Veszélyeztetett, a szisztémás keringés felől a pulmonális keringés felé irányuló sönthöz és Eisenmenger szindrómához társuló pulmonalis arteriális hipertónia NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben 12 éves kor felett a remisszió fennállásáig

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Kardiológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- OPSUMIT 10 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/13/893/002
- STAYVEER 125 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/13/832/002
- STAYVEER 125 MG FILMTABLETTA	56x hdpe palackban	EU/1/13/832/006
- STAYVEER 62,5 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/13/832/001
- STAYVEER 62,5 MG FILMTABLETTA	56x hdpe palackban	EU/1/13/832/005

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I2700, M3480, Q2180

Kijelölt intézet

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)

Kijelölt intézet

- Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 31/d.**Támogatott indikációk:**

>> Felőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertóniában (IPAH) szenvedő betegek részére, amennyiben az EÜ100 31/a. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer legalább 3 hónapos alkalmazása, majd ezt követően az EÜ100 31/b. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer legalább 3 hónapos alkalmazása során a terápiás válasz nem volt megfelelő (perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú IPAH), a kedvező terápiás hatás fennállásáig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Kardiológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ADEMPAS 0,5 MG FILMTABLETTA	42x buboréksomagolásban	EU/1/13/907/001
- ADEMPAS 1 MG FILMTABLETTA	42x buboréksomagolásban	EU/1/13/907/004
- ADEMPAS 1,5 MG FILMTABLETTA	42x buboréksomagolásban	EU/1/13/907/007
- ADEMPAS 2 MG FILMTABLETTA	42x buboréksomagolásban	EU/1/13/907/010
- ADEMPAS 2,5 MG FILMTABLETTA	42x buboréksomagolásban	EU/1/13/907/013
- REMODULIN 10 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x20ml injekciós üvegben	OGYI-T-20185/04
- REMODULIN 2,5 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x20ml injekciós üvegben	OGYI-T-20185/02
- REMODULIN 5 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x20ml injekciós üvegben	OGYI-T-20185/03
- TRESUVI 10 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x10ml injekciós üvegben	OGYI-T-23594/04
- TRESUVI 2,5 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x10ml injekciós üvegben	OGYI-T-23594/02
- TRESUVI 5 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x10ml injekciós üvegben	OGYI-T-23594/03
- UPTRAVI 1000 MIKROGRAMM FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/15/1083/007
- UPTRAVI 1200 MIKROGRAMM FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/15/1083/008
- UPTRAVI 1400 MIKROGRAMM FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/15/1083/009
- UPTRAVI 1600 MIKROGRAMM FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/15/1083/010
- UPTRAVI 200 MIKROGRAMM FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/15/1083/002
- UPTRAVI 400 MIKROGRAMM FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/15/1083/004
- UPTRAVI 600 MIKROGRAMM FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/15/1083/005
- UPTRAVI 800 MIKROGRAMM FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/15/1083/006

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I2700

Kijelölt intézet

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 32.**Támogatott indikációk:**

- >> Essentialis thrombocytaemia kezelésére, ha más kezeléssel nem érhető el a megfelelő thrombocytaszám-csökkenés, vagy gyógyszer okozta súlyos mellékhatás (lábszárfekély, bőrfekély), vagy túlérzékenység jelentkezik

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- ANAGRELID PHARMACENTER 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x hdpe tartályban	OGYI-T-23357/01
- ANAGRELIDE SANDOZ 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x hdpe tartályban	OGYI-T-23329/01
- ANAGRELIDE STADA 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x hdpe tartályban	OGYI-T-23278/02
- ANAGRELIDE VIPHARM 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x hdpe tartályban	OGYI-T-23312/02
- THROMBOREDUCTIN 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x hdpe tartályban	OGYI-T-09545/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D4730

EÜ100 33.**Támogatott indikációk:**

- >> Krónikus veseelégtelenség mellett fellépő táplálkozási fehérje hiány esetén, amennyiben a GFR 25 ml/perc értéknél kevesebb, és az előírt fehérjebevitel maximum napi 40g, a diéta kiegészítéseként

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- KETOSTERIL FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	OGYI-T-04359/01
- KETOSTERIL FILMTABLETTA	300x buborékcsomagolásban	OGYI-T-04359/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): N18, N19

EÜ100 34.**Támogatott indikációk:**

>> Sclerosis multiplex esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermeckororológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Neurológia	írhat

Termék név	Kiszereles	Törzskönyvi szám
- AUBAGIO 14 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/13/838/002
- AVONEX 30 MIKROGRAMM/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	4x előretöltött injekciós tollban +4 tű+4 védőkupak	EU/1/97/033/005
- BETAFFERON 250 MIKROGRAMM/ML POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	15x injekciós üvegben +15x(1 db előre töltött fecskendő+1 db tűvel felszerelt adapter+2 db alkoholos törő)	EU/1/95/003/005
- BONAXON 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23731/01
- CHANTICO 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban opa/al/pvc/al	OGYI-T-23706/05
- COPAXONE 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	28x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-09993/01
- COPAXONE 40 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	12x1ml előretöltött fecskendőben	OGYI-T-09993/04
- EFIGALO 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban opa/al/pvc/al	OGYI-T-23815/01
- EFIGALO 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pvc/al	OGYI-T-23815/04
- FINGOLIMOD PHARMASCIENCE 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23896/01
- FINGOLIMOD RICHTER 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pvc/al	OGYI-T-23930/04
- FINGOLIMOD-Q PHARMA 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23733/03
- GAXENIM 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban pvc/pvdc //al	OGYI-T-23859/01
- GILENYA 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	EU/1/11/677/005
- INZOLFI 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban napárjelzéses átlátszó pvc/pvdc/al	OGYI-T-23902/07
- LEMTRADA 12 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x injekciós üvegben	EU/1/13/869/001
- LOGNIF 0,25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pvc/al	OGYI-T-23765/02

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- LOGNIF 0,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	OGYI-T-23765/06
- MAVENCLAD 10 MG TABLETTA	1x buboréksomagolásban	EU/1/17/1212/001
- MAVENCLAD 10 MG TABLETTA	4x buboréksomagolásban	EU/1/17/1212/002
- MAVENCLAD 10 MG TABLETTA	6x buboréksomagolásban	EU/1/17/1212/004
- OCREVUS 300 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x10ml injekciós üvegben	EU/1/17/1231/001
- PLEGRIDY 125 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN (I.M.)	2x előretöltött fecskendőben	EU/1/14/934/007
- PLEGRIDY 125 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	2x előretöltött injekciós tollban	EU/1/14/934/005
- PLEGRIDY 63 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN, PLEGRIDY 94 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1+1x63+94mcg előretöltött injekciós tollban	EU/1/14/934/002
- REBIF 44 MIKROGRAMM/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	4x patronban	EU/1/98/063/009
- REMUREL 40 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	12x előretöltött fecskendőben	OGYI-T-23013/06
- TECFIDERA 120 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	14x buboréksomagolásban	EU/1/13/837/001
- TECFIDERA 240 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	56x buboréksomagolásban	EU/1/13/837/002
- TYSABRI 150 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	2x1ml előretöltött fecskendőben	EU/1/06/346/002
- TYSABRI 300 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x15ml	EU/1/06/346/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G35

Kijelölt intézet

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (Budapest)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Heim Pál Gyermekkórház-Rend.I. (Budapest)
- Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa (Zala megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger (Heves megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (Budapest)
- Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)

Kijelölt intézet

- Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa (Pest megye)
- Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (Budapest)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (Budapest)
- Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján (Nógrád megye)
- Tolna Megyei Balassa János Kórház (Tolna megye)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)
- Vaszary Kolos Kórház, Esztergom (Komárom-Esztergom megye)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ100 35.**Támogatott indikációk:**

- >> Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és kétféle GH provokációs teszttel (a csúcskoncentráció 10 ng/ml, azaz 30 mE/l alatt van) megerősített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb mint 2 cm növekedés)
- >> Kromoszóma-vizsgálattal vagy molekuláris genetikai vizsgálattal (FISH) igazolt Turner-szindróma kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- >> Operált craniopharyngeomás gyermek kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- >> Pubertás kor előtt, optimalizált táplálkozási és anyagcsere státusz mellett fennálló krónikus veseelégtelenséggel összefüggő növekedési zavar kezelése a vese-transzplantáció elvégzéséig, vagy a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- >> Felnőttkorban (>18 éves életkor) kórismézett, hypothalamus-hypophysis betegség, vagy annak kezelése következtében létrejövő súlyos GH hiányban szenvedő beteg részére, amennyiben provokációs tesztekkel (inzulin hypoglikémiás teszt, arginin teszt, arginin-GHRH teszt, glucagon teszt) 3 ng/ml (<3mcg/l) alatti szérumszintű GH csúcskoncentráció igazolható (GH hiány mellett - prolactint leszámítva - még legalább egy hypophysis mellsőleány hormon-elégtelenség kimutatható, vagy gyermekkorban kezdődő GH-hiány újraértékelése esetén egy provokációs teszt, felnőttkori izolált GH-hiány esetén második stimulációs teszt elvégzése szükséges) és a GH-hiányhoz társuló egyéb hypophysis hormonhiány pótlása megkezdődött (a kortizol, illetve a nemi hormonok adagjának stabilizálása három, a tiroxin adagjának stabilizálása egy hónappal a GH kezelés megkezdése előtt szükséges)

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Endokrinológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Nephrológia	írhat

Termék név	Kíszerelés	Törzskönyvi szám
- GENOTROPIN 12 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x kétrekeszes patronban	OGYI-T-02050/02
- GENOTROPIN 12 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	5x kétrekeszes patronban	OGYI-T-02050/03

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- GENOTROPIN 5,3 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	5x kétrekeszes patronban	OGYI-T-02050/01
- HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN	1x patronban +1x3,17 ml oldószer fecskendőben	OGYI-T-05243/01
- HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN	5x patronban +5x3,17 ml oldószer fecskendőben	OGYI-T-05243/02
- HUMATROPE 36 NE (12 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN	1x patronban +1x3,15 ml oldószer fecskendőben	OGYI-T-05243/03
- HUMATROPE 36 NE (12 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN	5x patronban +5x3,15 ml oldószer fecskendőben	OGYI-T-05243/04
- HUMATROPE 72 NE (24 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN	1x patronban +1x3,15 ml oldószer fecskendőben	OGYI-T-05243/05
- NORDITROPIN NORDIFLEX 10 MG/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x1,5ml előretöltött injekciós tollban	OGYI-T-07700/14
- NORDITROPIN NORDIFLEX 15 MG/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x1,5ml előretöltött injekciós tollban	OGYI-T-07700/15
- NORDITROPIN NORDIFLEX 5 MG/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x1,5ml előretöltött fecskendőben	OGYI-T-07700/13
- NORDITROPIN SIMPLEXX 10 MG/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x1,5ml patronban	OGYI-T-07700/03
- NORDITROPIN SIMPLEXX 15 MG/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x1,5ml patronban	OGYI-T-07700/05
- NORDITROPIN SIMPLEXX 5 MG/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x1,5ml patronban	OGYI-T-07700/01
- NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 NE) OLDATOS INJEKCIÓ	1x2ml patronban	EU/1/00/164/003
- NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 NE) OLDATOS INJEKCIÓ	3x2ml patronban	EU/1/00/164/004
- OMNITROPE 10 MG/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x1,5ml patronban az üvegpatron véglegesen rögzítve van egy átlátszó tartályban, amelyet az egyik végén menetes rúddal rendelkező, műanyag mechanizmusra szerelnek.	EU/1/06/332/016
- OMNITROPE 10 MG/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	1x1,5ml patronban	EU/1/06/332/007
- OMNITROPE 5 MG/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x1,5ml patronban az üvegpatron véglegesen rögzítve van egy átlátszó tartályban, amelyet az egyik végén menetes rúddal rendelkező, műanyag mechanizmusra szerelnek.	EU/1/06/332/013
- OMNITROPE 5 MG/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	1x1,5ml patronban	EU/1/06/332/004
- SAIZEN 5,83 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	1x1,03ml patronban	OGYI-T-07358/03
- SAIZEN 8 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	1x1,5ml patronban	OGYI-T-07358/05
- SAIZEN 8 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	1x2,5ml patronban	OGYI-T-07358/07

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D3530, E23, E8930, N18, N19, Q96

Kijelölt intézet

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó (Csongrád-Csanád megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (Budapest)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Kijelölt intézet

- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger (Heves megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa (Pest megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján (Nógrád megye)

EÜ100 36/a.**Támogatott indikációk:**

>> Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján, az adott készítmény alkalmazási előírásának megfelelően

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Haematológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- IMATINIB ACCORD 400 MG FILMTABLETTA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/13/845/020
- IMATINIB MYLAN 100 MG FILMTABLETTA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-23077/01
- IMATINIB MYLAN 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23077/02
- IMATINIB ONKOGEN 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-23171/02
- IMATINIB ONKOGEN 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23171/05
- IMATINIB PHARMACENTER 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban pvc/pvdc/al	OGYI-T-24054/07
- IMATINIB SANDOZ 100 MG FILMTABLETTA	120x buboréksomagolásban (pvc/al)	OGYI-T-22936/02
- IMATINIB SANDOZ 100 MG FILMTABLETTA	120x buboréksomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	OGYI-T-22936/04
- IMATINIB SANDOZ 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	OGYI-T-22936/06
- IMATINIB STADA 100 MG FILMTABLETTA	120x hdpe tartályban	OGYI-T-22912/02
- IMATINIB STADA 400 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-22912/04
- IMATINIB TEVA 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc/pe/pvc/al	EU/1/12/808/017

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- LATIB 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-23048/01
- LATIB 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23048/02
- NIBIX 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-22801/04
- NIBIX 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-22801/07
- SPRYCEL 100 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/06/363/010
- SPRYCEL 70 MG FILMTABLETTA	60x hdpe palackban	EU/1/06/363/003
- TASIGNA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	112x buboréksomagolásban	EU/1/07/422/006

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C9210

Kijelölt intézet

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Bugát Pál Kórház, Gyöngyös (Heves megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Karolina Kórház és Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár (Győr-Moson-Sopron megye)
- Károlyi Sándor Kórház (Budapest)
- Keszthelyi Kórház (Zala megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger (Heves megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
- Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján (Nógrád megye)
- Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros (Fejér megye)
- Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd (Pest megye)
- Tolna Megyei Balassa János Kórház (Tolna megye)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ100 36/b.**Támogatott indikációk:**

>> Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) másodvonalbeli kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Haematológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- BOSULIF 100 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsoomagolásban	EU/1/13/818/001
- BOSULIF 500 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsoomagolásban	EU/1/13/818/003
- SPRYCEL 100 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/06/363/010
- SPRYCEL 140 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/06/363/014
- SPRYCEL 50 MG FILMTABLETTA	60x hdpe palackban	EU/1/06/363/002
- SPRYCEL 70 MG FILMTABLETTA	60x hdpe palackban	EU/1/06/363/003
- TASIGNA 200 MG KEMÉNY KAPSZULA	112x buborékcsoomagolásban (pvc/pvdc/al), gyűjtőcsoomagolás	EU/1/07/422/008

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C9210**Kijelölt intézet**

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Karolina Kórház és Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár (Győr-Moson-Sopron megye)
- Keszthelyi Kórház (Zala megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger (Heves megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)

Kijelölt intézet

- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
- Tolna Megyei Balassa János Kórház (Tolna megye)

EÜ100 36/c.**Támogatott indikációk:**

- >> Újonnan diagnosztizált Philadelphia kromoszóma pozitív (Ph+) akut lymphoblastos leukémiás (ALL) felnőtt beteg kezelése kemoterápiával kiegészítve a betegség progressziójáig
- >> Recidivált vagy refrakter Ph+ ALL-es felnőtt beteg kezelésére monoterápiában a betegség progressziójáig

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Haematológia	írhat

Termék név	Készítés	Törzskönyvi szám
- IMATINIB ACCORD 400 MG FILMTABLETTA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/13/845/020
- IMATINIB MYLAN 100 MG FILMTABLETTA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-23077/01
- IMATINIB MYLAN 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23077/02
- IMATINIB ONKOGEN 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-23171/02
- IMATINIB ONKOGEN 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23171/05
- IMATINIB PHARMACENTER 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban pvc/pvdc/al	OGYI-T-24054/07
- IMATINIB SANDOZ 100 MG FILMTABLETTA	120x buboréksomagolásban (pvc/al)	OGYI-T-22936/02
- IMATINIB SANDOZ 100 MG FILMTABLETTA	120x buboréksomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	OGYI-T-22936/04
- IMATINIB SANDOZ 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	OGYI-T-22936/06
- IMATINIB STADA 100 MG FILMTABLETTA	120x hdpe tartályban	OGYI-T-22912/02
- IMATINIB STADA 400 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-22912/04
- IMATINIB TEVA 400 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc/pe/pvc/al	EU/1/12/808/017
- LATIB 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	120x buboréksomagolásban	OGYI-T-23048/01
- LATIB 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23048/02

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- NIBIX 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	120x buborécsomagolásban	OGYI-T-22801/04
- NIBIX 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buborécsomagolásban	OGYI-T-22801/07

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C9100

Kijelölt intézet
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 37/a.

Támogatott indikációk:

>> Gastrointestinális stromából kiinduló (GIST), nem rezekálható vagy metasztatikus malignus tumorok kezelése, amennyiben az EÜ100 8/t. pont szerinti (c-kit mutáció meghatározás) molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében az imatinib kezeléssel szemben bizonyítottan rezisztencia vagy intolerancia áll fenn

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Klinikai onkológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- KLERTIS 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborécsomagolásban	OGYI-T-23855/01
- KLERTIS 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborécsomagolásban	OGYI-T-23855/02
- KLERTIS 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborécsomagolásban	OGYI-T-23855/03
- SUGANET 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buborécsomagolásban szárítószerrel ellátott opa/al/pe//al leghúzható	OGYI-T-23888/05

	Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
	- SUGANET 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban szárítószerrel ellátott opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23888/10
	- SUGANET 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban szárítószerrel ellátott opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23888/15
	- SUNDIT 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/pctfe//al	OGYI-T-23943/01
	- SUNDIT 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/pctfe//al	OGYI-T-23943/06
	- SUNDIT 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/pctfe//al	OGYI-T-23943/11
új	- SUNITINIB ACCORD 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	EU/1/20/1511/006
új	- SUNITINIB ACCORD 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	EU/1/20/1511/012
	- SUNITINIB G.L. PHARMA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23795/02
	- SUNITINIB G.L. PHARMA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23795/04
	- SUNITINIB G.L. PHARMA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23795/06
	- SUNITINIB KRKA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23887/07
	- SUNITINIB KRKA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23887/15
	- SUNITINIB KRKA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23887/23
	- SUNITINIB ONKOGEN 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23947/02
	- SUNITINIB ONKOGEN 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23947/05
	- SUNITINIB ONKOGEN 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23947/08
	- SUNITINIB PHARMASCIENCE 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/02
	- SUNITINIB PHARMASCIENCE 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/04
	- SUNITINIB PHARMASCIENCE 37,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/06
	- SUNITINIB PHARMASCIENCE 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/08
	- SUNITINIB STADA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23524/03
	- SUNITINIB STADA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23524/06
	- SUNITINIB STADA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23524/09
	- SUNITINIB TEVA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23349/01
	- SUNITINIB TEVA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23349/02
	- SUNITINIB TEVA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23349/04

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- SUNITINIB-AZR 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23892/02
- SUNITINIB-AZR 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23892/07
- SUNITINIB-AZR 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23892/17
- SUTENT 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe palackban	EU/1/06/347/001
- SUTENT 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe palackban	EU/1/06/347/002
- SUTENT 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe palackban	EU/1/06/347/003
- SZUNITINIB MYLAN 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23528/01
- SZUNITINIB MYLAN 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23528/04
- SZUNITINIB MYLAN 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23528/10
- SZUNITINIB SANDOZ 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23539/04
- SZUNITINIB SANDOZ 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23539/21
- SZUNITINIB SANDOZ 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23539/38
- ZESUVA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23532/03
- ZESUVA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23532/06
- ZESUVA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23532/12

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

Kijelölt intézet

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Dr. Bugyi István Kórház, Szentés (Csongrád-Csanád megye)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa (Pest megye)
- Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (Budapest)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)

Kijelölt intézet

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (Budapest)
- Szent Margit Kórház, Budapest (Budapest)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ100 37/b.**Támogatott indikációk:**

- >> Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére a folyamat WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Klinikai onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- AFINITOR 10 MG TABLETTA	30x	EU/1/09/538/004
- AFINITOR 5 MG TABLETTA	30x	EU/1/09/538/001
- CABOMETYX 20 MG FILMTABLETTA	30x hdpe palackban	EU/1/16/1136/002
- CABOMETYX 40 MG FILMTABLETTA	30x hdpe palackban	EU/1/16/1136/004
- CABOMETYX 60 MG FILMTABLETTA	30x hdpe palackban	EU/1/16/1136/006
- EVEROLIMUS KRKA 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23403/07
- EVEROLIMUS KRKA 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23403/04
- EVEROLIMUS ONKOGEN 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	OGYI-T-23974/02
- EVEROLIMUS ONKOGEN 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	OGYI-T-23974/01
- EVEROLIMUS SANDOZ 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23502/15
- EVEROLIMUS SANDOZ 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23502/09
- EVEROLIMUS VIPHARM 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23574/07
- EVEROLIMUS VIPHARM 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23574/04
- EVEROLIMUS ZENTIVA 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23373/07
- EVEROLIMUS ZENTIVA 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23373/04

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- INLYTA 1 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/12/777/002
- INLYTA 5 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/12/777/005
- KLERTIS 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23855/01
- KLERTIS 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23855/02
- KLERTIS 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23855/03
- SUGANET 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban szárítószerrel ellátott opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23888/05
- SUGANET 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban szárítószerrel ellátott opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23888/10
- SUGANET 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban szárítószerrel ellátott opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23888/15
- SUNDIT 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/pctfe//al	OGYI-T-23943/01
- SUNDIT 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/pctfe//al	OGYI-T-23943/06
- SUNDIT 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/pctfe//al	OGYI-T-23943/11
új - SUNITINIB ACCORD 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	EU/1/20/1511/006
új - SUNITINIB ACCORD 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	EU/1/20/1511/012
- SUNITINIB G.L. PHARMA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23795/02
- SUNITINIB G.L. PHARMA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23795/04
- SUNITINIB G.L. PHARMA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23795/06
- SUNITINIB KRKA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23887/07
- SUNITINIB KRKA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23887/15
- SUNITINIB KRKA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23887/23
- SUNITINIB ONKOGEN 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23947/02
- SUNITINIB ONKOGEN 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23947/05
- SUNITINIB ONKOGEN 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23947/08
- SUNITINIB PHARMASCIENCE 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/02
- SUNITINIB PHARMASCIENCE 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/04
- SUNITINIB PHARMASCIENCE 37,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/06

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- SUNITINIB PHARMASCIENCE 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/08
- SUNITINIB STADA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23524/03
- SUNITINIB STADA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23524/06
- SUNITINIB STADA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23524/09
- SUNITINIB TEVA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23349/01
- SUNITINIB TEVA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23349/02
- SUNITINIB TEVA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23349/04
- SUNITINIB-AZR 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23892/02
- SUNITINIB-AZR 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23892/07
- SUNITINIB-AZR 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23892/17
- SUTENT 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe palackban	EU/1/06/347/001
- SUTENT 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe palackban	EU/1/06/347/002
- SUTENT 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe palackban	EU/1/06/347/003
- SZUNITINIB MYLAN 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23528/01
- SZUNITINIB MYLAN 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23528/04
- SZUNITINIB MYLAN 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23528/10
- SZUNITINIB SANDOZ 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23539/04
- SZUNITINIB SANDOZ 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23539/21
- SZUNITINIB SANDOZ 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23539/38
- TORISEL 30 MG KONCENTRÁTUM ÉS OLDÓSZER OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x injekciós üvegben +1x injekciós üveg	EU/1/07/424/001
- VERIMMUS 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban (3x10)	OGYI-T-23581/08
- VERIMMUS 10 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban (6x5)	OGYI-T-23581/09
- VERIMMUS 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban (3x10)	OGYI-T-23581/03
- VERIMMUS 5 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban (6x5)	OGYI-T-23581/04
- VOTRIENT 200 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/10/628/001
- VOTRIENT 400 MG FILMTABLETTA	60x hdpe tartályban	EU/1/10/628/004
- ZESUVA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23532/03
- ZESUVA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23532/06
- ZESUVA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23532/12

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C64

Kijelölt intézet

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Margit Kórház, Budapest (Budapest)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ100 37/c.**Támogatott indikációk:**

- >> Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére - interferon vagy IL-2 kezelést követően, a folyamat WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Klinikai onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- FENESA 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-23702/04
- INLYTA 1 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/12/777/002
- INLYTA 5 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/12/777/005
- KLERTIS 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23855/01
- KLERTIS 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23855/02
- KLERTIS 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23855/03

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- RENIXOLA 200 MG FILMTABLETTA	112x1 buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al naptárjelzés nélküli perforált	OGYI-T-23949/04
- SORAFENIB G.L. PHARMA 200 MG FILMTABLETTA	112x adagonként perforált buboréksomagolásban	OGYI-T-23711/01
- SORAFENIB MYLAN 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban	OGYI-T-23719/01
- SORAFENIB ONKOGEN 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban opa/alumínium/pvc - alumínium	OGYI-T-23926/01
- SORAFENIB PHARMASCIENCE 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-23696/05
- SORAFENIB SANDOZ 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-23697/01
- SORAFENIB SANDOZ 400 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	OGYI-T-23697/03
- SORAFENIB STADA 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-23695/04
- SORAFENIB STADA 400 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	OGYI-T-23695/10
- SORAFENIB TEVA 200 MG FILMTABLETTA	112x1 adagonként perforált buboréksomagolásban (pvc/aclar/pvc-al)	OGYI-T-23493/01
- SORATINA 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban	OGYI-T-23909/01
- SUGANET 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban szárítószerrel ellátott opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23888/05
- SUGANET 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban szárítószerrel ellátott opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23888/10
- SUGANET 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban szárítószerrel ellátott opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23888/15
- SUNDIT 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/pctfe//al	OGYI-T-23943/01
- SUNDIT 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/pctfe//al	OGYI-T-23943/06
- SUNDIT 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/pctfe//al	OGYI-T-23943/11
új - SUNITINIB ACCORD 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	EU/1/20/1511/006
új - SUNITINIB ACCORD 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	EU/1/20/1511/012
- SUNITINIB G.L. PHARMA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23795/02
- SUNITINIB G.L. PHARMA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23795/04
- SUNITINIB G.L. PHARMA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23795/06

Termék név	Kiszereelés	Törzskönyvi szám
- SUNITINIB KRKA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23887/07
- SUNITINIB KRKA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23887/15
- SUNITINIB KRKA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23887/23
- SUNITINIB ONKOGEN 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23947/02
- SUNITINIB ONKOGEN 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23947/05
- SUNITINIB ONKOGEN 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23947/08
- SUNITINIB PHARMASCIENCE 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/02
- SUNITINIB PHARMASCIENCE 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/04
- SUNITINIB PHARMASCIENCE 37,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/06
- SUNITINIB PHARMASCIENCE 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban pvc/pvac (pvc/pctfe)//al	OGYI-T-23945/08
- SUNITINIB STADA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23524/03
- SUNITINIB STADA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23524/06
- SUNITINIB STADA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23524/09
- SUNITINIB TEVA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23349/01
- SUNITINIB TEVA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23349/02
- SUNITINIB TEVA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23349/04
- SUNITINIB-AZR 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23892/02
- SUNITINIB-AZR 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23892/07
- SUNITINIB-AZR 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban opa/al/pe//al lehúzható	OGYI-T-23892/17
- SUTENT 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe palackban	EU/1/06/347/001
- SUTENT 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe palackban	EU/1/06/347/002
- SUTENT 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe palackban	EU/1/06/347/003
- SZUNITINIB MYLAN 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23528/01
- SZUNITINIB MYLAN 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23528/04
- SZUNITINIB MYLAN 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23528/10
- SZUNITINIB SANDOZ 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23539/04
- SZUNITINIB SANDOZ 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23539/21
- SZUNITINIB SANDOZ 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23539/38
- VOTRIENT 200 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/10/628/001
- VOTRIENT 400 MG FILMTABLETTA	60x hdpe tartályban	EU/1/10/628/004

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- ZESUVA 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23532/03
- ZESUVA 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23532/06
- ZESUVA 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23532/12

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C64

Kijelölt intézet
- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Margit Kórház, Budapest (Budapest)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ100 38/a.

Támogatott indikációk:

>> Krónikus vastűterhelés, amennyiben transzfúzió okozta haemosiderosis, vagy idiopathiás (primer) haemochromatosis, vagy porphyria cutanea tardaival együttjáró vastűterhelés áll fenn

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek hemato-onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- DESFERAL 0,5 G POR OLDATOS INFÚZIÓHOZ	10x injekciós üvegben	OGYI-T-01065/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E8010, E8310

EÜ100 38/b.**Támogatott indikációk:**

- >> Krónikus vastűterhelés kezelése 6 éves és idősebb, béta-thalassaemia majorban szenvedő betegnek, aki több mint 7 ml/kg/hónap vörösvértest-koncentrátumot kap, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
- >> A 2-5 év közötti beteg számára, akinél a vastűterhelés nem transzfúziós okú, hanem a vérszegénységgel együtt járó tartós haemolysis miatt alakul ki, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
- >> A nagy mennyiségű (7 ml/ttkg/hó értéket elérő vagy azt meghaladó) vörösvértest-koncentrátumot igénylő, transzplantációs listára került myelodysplasia (MDS) szindrómás beteg részére, haemosiderosis kivédése céljából, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
- >> Nemzetközi prognosztikai index alapján kedvező prognózisú (a várható élettartama 3 évnél hosszabb) gyakori transzfúziót (7 ml/ttkg/hó értéket elérő vagy azt meghaladó vörösvértest koncentrátum) kapó MDS-ben szenvedő betegek részére, ahol a csontvelői myeloblast arány nem haladhatja meg az 10%-ot, s a cytogenetikai vizsgálat eredménye normális vagy abban kedvező eltérések vannak (nem támogathatók az 5 és 7 chromosoma veszteséssel járó esetek), a kezelést 2000 ng/ml-es ferritin szint elérésekor lehet elkezdni

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Haematológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- DEFERASIROX PHARMASCIENCE 360 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban al/átlátszó pvc/pe/pvdc	OGYI-T-23940/07
- DEFERASIROX SANDOZ 360 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban pvc/pvdc/al	OGYI-T-23856/11
- EXFERANA 180 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban pvc/pvdc/al	OGYI-T-23751/09
- EXFERANA 360 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban pvc/pvdc/al	OGYI-T-23751/17
- EXJADE 180 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/06/356/014
- EXJADE 360 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/06/356/017

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D46, D5610

Kijelölt intézet

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Bugát Pál Kórház, Gyöngyös (Heves megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)

Kijelölt intézet

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Karolina Kórház és Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár (Győr-Moson-Sopron megye)
- Keszthelyi Kórház (Zala megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger (Heves megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
- Tolna Megyei Balassa János Kórház (Tolna megye)

EÜ100 39/a.**Támogatott indikációk:**

>> Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése, amennyiben a beteg szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a konvencionális aktív D-vitamin kezelést dokumentáltan meg kellett szakítani a szérum kalciumszint normál szint fölé emelkedése miatt ($\text{Ca} > 2,4 \text{ mmol/l}$) vagy normokalcemia esetén ($\text{Ca} < 2,4 \text{ mmol/l}$), ha a szérum iPTH > 800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Nephrológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje korlátlan.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- PARICALCITOL FRESENIUS 5 MIKROGRAMM/ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x1ml injekciós üvegben	OGYI-T-22118/08
- ZEMPLAR 2 MIKROGRAMM LÁGY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban	OGYI-T-09951/07

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E2110**Kijelölt intézet**

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- FMC Dialízis Center Egészségügyi Kft., Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Kijelölt intézet

- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (Budapest)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)

EÜ100 39/b.**Támogatott indikációk:**

>> Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése, amennyiben szérumszint iPTH 500-800 pg/ml között van, és a szérumszint Ca >2,4 mmol/l és a CaxP >4,44 mmol/l², vagy a szérumszint iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Nephrológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje korlátlan.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- MIMPARA 30 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/04/292/002
- MIMPARA 60 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	EU/1/04/292/006
- PARSABIV 2,5 MG OLDATOS INJEKCIÓ	6x0,5ml injekciós üvegben	EU/1/16/1142/002
- PARSABIV 5 MG OLDATOS INJEKCIÓ	6x1ml injekciós üvegben	EU/1/16/1142/006

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E2110

EÜ100 41.**Támogatott indikációk:**

>> Intermediár vagy előrehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification - BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelése, jó májfunkció (Child Pugh szerinti A stádiumú) és megfelelő általános állapot (ECOG 0-2) esetén, amennyiben az előzetes lokoregionális terápia nem hoz megfelelő eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, az onkoteam dokumentált döntése alapján, a WHO-kritériumok szerinti progresszióig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Klinikai onkológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- FENESA 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-23702/04

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- RENIXOLA 200 MG FILMTABLETTA	112x1 buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al naptárjelzés nélküli perforált	OGYI-T-23949/04
- SORAFENIB G.L. PHARMA 200 MG FILMTABLETTA	112x adagonként perforált buboréksomagolásban	OGYI-T-23711/01
- SORAFENIB MYLAN 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban	OGYI-T-23719/01
- SORAFENIB ONKOGEN 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban opa/alumínium/pvc - alumínium	OGYI-T-23926/01
- SORAFENIB PHARMASCIENCE 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-23696/05
- SORAFENIB SANDOZ 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-23697/01
- SORAFENIB SANDOZ 400 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	OGYI-T-23697/03
- SORAFENIB STADA 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	OGYI-T-23695/04
- SORAFENIB STADA 400 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	OGYI-T-23695/10
- SORAFENIB TEVA 200 MG FILMTABLETTA	112x1 adagonként perforált buboréksomagolásban (pvc/aclar/pvc-al)	OGYI-T-23493/01
- SORATINA 200 MG FILMTABLETTA	112x buboréksomagolásban	OGYI-T-23909/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C2200

Kijelölt intézet

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ100 42.**Támogatott indikációk:**

>> Enyhe és közép súlyos A hemofiliában vagy von Willebrand betegségben, spontán vérzés kezelésére vagy a vérzés megelőzésére kis műtétek esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Haematológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- OCTOSTIM 1,5 MG/ML OLDATOS ORRSpray	1x2,5ml üvegben	OGYI-T-08941/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D6600, D6800

Kijelölt intézet

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)

EÜ100 43.**Támogatott indikációk:**

>> Endokrin tünetekkel járó, előrehaladott stádiumú (inoperabilis, metasztatikus vagy progrediáló) mellékvesekéreg-carcinoma tüneti kezelése kombinációs kemoterápia részeként három hónapig, ezt követően - progressziómentesség esetén - a klinikai remisszió fennállásáig

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Endokrinológia	írhat
Kijelölt intézmény	Gyermekek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény	Klinikai onkológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- LYSODREN 500 MG TABLETTA	100x hdpe tartályban	EU/1/04/273/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C7400**Kijelölt intézet**

- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 50.**Támogatott indikációk:**

>> Szerzett immunhiányos állapot (HIV/AIDS)

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Infektológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
------------	------------	------------------

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23042/01
- BIKTARVY 50 MG/200 MG/25 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/18/1289/001
- CELSENTRI 150 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/07/418/003
- CELSENTRI 300 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/07/418/008
- COMBIVIR 150 MG/300 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/98/058/001
- DELSTRIGO 100 MG/300 MG/245 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/18/1333/001
- DOVATO 50 MG/300 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/19/1370/001
- DUNOTRISIN 200 MG/245 MG FILMTABLETTA	30x tartályban	OGYI-T-23018/01
- EDURANT 25 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/11/736/001
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 MG/245 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban (alu/alu)	EU/1/16/1133/003
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 MG/245 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23190/01
- EMTRICITABINE/TENOFOVIR-DISOPROXIL TEVA 200 MG/245 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban (nedvességmegkötő betétrel)	OGYI-T-23019/05
- EPIVIR 10 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x	EU/1/96/015/002
- EPIVIR 150 MG FILMTABLETTA	60x tartályban	EU/1/96/015/001
- EPIVIR 300 MG FILMTABLETTA	30x tartályban	EU/1/96/015/003
- GENVOYA 150 MG/150 MG/200 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/15/1061/001
- INTELENCE 200 MG TABLETTA	60x hdpe tartályban	EU/1/08/468/002
- ISENTRESS 400 MG FILMTABLETTA	60x hdpe tartályban	EU/1/07/436/001
- ISENTRESS 600 MG FILMTABLETTA	60x hdpe tartályban	EU/1/07/436/006
- JULUCA 50 MG/25 MG FILMTABLETTA	30x tartályban	EU/1/18/1282/001
- KALETRA 200 MG/50 MG FILMTABLETTA	120x hdpe tartályban	EU/1/01/172/004
- KIVEXA 600 MG/300 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	EU/1/04/298/002
- LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE TEVA 150 MG/300 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	EU/1/10/663/001
- LAZID 150 MG/300 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22591/02
- NEVIRAPINE TEVA 200 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	EU/1/09/598/001
- NEVITA 200 MG TABLETTA	60x buboréksomagolásban	OGYI-T-22533/02
- PIFELTRO 100 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/18/1332/001
- REZOLSTA 800 MG/150 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/14/967/001
- STOCRIN 600 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/99/111/008
- SYMTUZA 800 MG/150 MG/200 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/17/1225/001
- TABINERA 200 MG/245 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	OGYI-T-23670/01
- TENOFERA 245 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-23642/01
- TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/16/1129/001
- TENOFOVIR ONKOGEN 245 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	OGYI-T-23823/01

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- TENOFOVIR TEVA 245 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-22903/01
- TIVICAY 10 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/13/892/003
- TIVICAY 25 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/13/892/005
- TIVICAY 5 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	60x hdpe tartályban +1 mérőpohár +1 szájfecskendő	EU/1/13/892/007
- TIVICAY 50 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/13/892/001
- TRIUMEQ 50 MG/600 MG/300 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	EU/1/14/940/001
- VIROFOB 245 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	OGYI-T-23008/01
- ZIAGEN 20 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x flakonban +fecskendő+adapter	EU/1/99/112/002

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): B20, B21, B22, B23, B24, Z21

Kijelölt intézet

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)

EÜ100 51.

Támogatott indikációk:

- >> Újonnan diagnosztizált, glioblastoma multiforme (RPA III-IV.), (KPS>70) sebészeti beavatkozást követően, vagy inoperabilitás esetén sebészeti beavatkozás nélkül, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek ismeretében
- >> Progrediáló malignus gliómákban (glioblastoma multiforme RPA III-IV., anaplasztikus astrocytoma, oligodendroglioma, oligo-astrocytoma Grade III.) (KPS>70) standard kezelést (sebészi, radio- és kemoterápia) követően képalkotó eljárással igazolt recidíva, illetve progresszió esetén, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek ismeretében

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermek hemato-onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Klinikai onkológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Sugárterápia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- TEMODAL 180 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x1 tasakban	EU/1/98/096/019
- TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x tasakban	EU/1/10/615/029
- TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x tasakban	EU/1/10/615/031
- TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x tasakban	EU/1/10/615/033
- TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x tasakban	EU/1/10/615/027
- TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x tasakban	EU/1/10/615/035
- TEMOZOLOMIDE SUN 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x1 adagonként perforált buborékcsoomagolásban	EU/1/11/697/017
- TEMOZOLOMIDE SUN 140 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x1 adagonként perforált buborékcsoomagolásban	EU/1/11/697/019

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- TEMOZOLOMIDE SUN 180 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/11/697/021
- TEMOZOLOMIDE SUN 20 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/11/697/015
- TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/11/697/023
- TEMOZOLOMIDE TEVA 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x üveg tartályban	EU/1/09/606/005
- TEMOZOLOMIDE TEVA 140 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x üveg tartályban	EU/1/09/606/007
- TEMOZOLOMIDE TEVA 180 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x üveg tartályban	EU/1/09/606/009
- TEMOZOLOMIDE TEVA 20 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x üveg tartályban	EU/1/09/606/003
- TEMOZOLOMIDE TEVA 250 MG KEMÉNY KAPSZULA	5x üveg tartályban	EU/1/09/606/011

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C7100, C7110, C7120, C7130, C7140, C7150, C7160, C7170, C7180

Kijelölt intézet
- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (Budapest)
- Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)

EÜ100 52.

Támogatott indikációk:

>> Másodvonalban alkalmazott gyógyszeres terápiára rezisztens (rohamszám-redukció 50% alatt) 1-14 év közötti epilepsziás gyermekek ketogen diétájának bevezetésére, folyamatos szakorvosi és dietetikus szakember általi kontroll mellett, amennyiben egy hónapos terápiát követő kontrollvizsgálat már igazolja a hatékonyságot és három hónapos terápiát követően a rohamszám-redukció 50% felett van, legfeljebb két évig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Gyermeckororológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- KETOCAL 2,5:1 LQ VANÍLIÁ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	32x200 ml	T/3135/2022
- KETOCAL 3:1 ÍZESÍTETLEN SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	300 g	T/3137/2022
- KETOCAL 4:1 ÍZESÍTETLEN SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	300 g	T/3052/2021
- KETOCAL 4:1 VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	300 g	T/3053/2021

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E7400, E7440, F8030, G4030, G4040, G4050

Kijelölt intézet

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 55.

Támogatott indikációk:

- >> Súlyos tünetekkel járó (vérvizelés, súlyos vizeleti panaszok, klinikailag bizonyítottan az alapbetegséggel összefüggő csontfájdalmak), lokálisan előrehaladott vagy áttétes hormondependens prosztaták kezelésére (Gleason score: $\geq$ 3-4, TNM klasszifikáció: N0-1, M0-1) onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével
- >> Hormondependens prosztaták sugárterápiája esetén adjuvans és neoadjuvans formában onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével
- >> Radikális prostatectomiát követő relapsusok kezelésére onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugárterápia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- FIRMAGON 120 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	2x injekciós üvegben	EU/1/08/504/002
- FIRMAGON 80 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x	EU/1/08/504/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C61

EÜ100 56.**Támogatott indikációk:**

>> Súlyos, krónikus immun (idiopátiás) trombocytopeniás purpurában (ITP) (BNO D6930) szenvedő felnőtt betegek részére (vérelemzések szám 30x10⁹/l alatt van és fokozott a vérzési rizikó), ha a korábbi gyógyszeres (pl.: kortikoszteroiddal vagy immunglobulinnal végzett) terápiára tartósan nem reagált és azt követő splenectomiára refrakterré vált vagy ha a splenectomia dokumentáltan (hematológus-sebész-aneszteziológus team véleménye alapján) ellenjavallt, a kezelést fel kell függeszteni, ha a vérelemzések szám négyheti, maximális adag alkalmazása mellett sem éri el a klinikailag jelentős vérzés elkerüléséhez szükséges szintet

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Haematológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- NPLATE 250 MIKROGRAMM POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x250mcg porüveg +1 oldószerez előretöltött fecskendő+1 injekciós üveg adapter+1 tű+1 fecskendő+4 alkoholos törlő	EU/1/08/497/005
- NPLATE 250 MIKROGRAMM POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x250mcg porüveg	EU/1/08/497/001
- REVOLADE 25 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	EU/1/10/612/002
- REVOLADE 50 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	EU/1/10/612/005

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D6930**Kijelölt intézet**

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Karolina Kórház és Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár (Győr-Moson-Sopron megye)
- Keszthelyi Kórház (Zala megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger (Heves megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Vérellátó Szolgálat (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Kijelölt intézet

- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Szent Borbála Kórház, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
- Tolna Megyei Balassa János Kórház (Tolna megye)

EÜ100 57.**Támogatott indikációk:**

- >> Hosszútávú, elsődleges vagy másodlagos megelőzőként folyamatos alvadástgátló kezelés szükségessége esetén
- malignus daganatban szenvedő beteg részére egyéb járulékos thrombogén tényező (immobilitás, kemoterápia, hormonterápia, angiogenezis-gátló, thalidomid vagy lenalinomid kezelés, a daganat, annak áttéte vagy nyirokpangás által okozott érkompresszió) fennállásának időtartamára, valamint korábbi vénás thromboembóliás epizódok követően,
 - várandósság idején hosszútávú K-vitamin antagonistával végzett kezelés folytatásaként, ha az előzményben provokáló tényező nélkül vagy ösztrogén kezelés miatt kialakult vénás thromboembolia vagy a várandósság során kialakult vénás thromboembolia szerepel, továbbá amennyiben a családi anamnézisben pozitív és ismert homozigóta FV Leiden vagy homozigóta homozigóta FII G20210A pontmutáció, kombinált örökletes thrombosiskészség, klinikai és laboratóriumi definíciónak megfelelő antifoszfolipid betegség van,
 - az EÜ90 4/a1., 4/b1. vagy 4/c1. indikációs pont szerinti legalább 3 hónapos megszakítás nélküli járóbeteg-ellátás keretében történő terápia folytatásaként a kockázat fennállásának idejére, amennyiben K-vitamin antagonisták adása ellenjavallt vagy K-vitamin antagonisták adása mellett legalább grade II. súlyosságú gastrointestinalis vagy hepaticus mellékhatás, vasculitis, cumarin necrosis, blue toe syndroma, normális vasforgalmi adatok mellett kifejezett hajhullás, INR érték alapján nem túladagolásból adódó vérzés vagy splanchnicus vagy vena hepatica thrombosis jelentkezik.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Érsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekek hemato-onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Idegsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Mellkassebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szívsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészeti-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- CLEXANE FORTE 12 000 NE (120 MG)/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,8ml előretöltött fecsekendőben	OGYI-T-04097/13
- CLEXANE FORTE 15 000 NE (150 MG)/1 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x1,0ml előretöltött fecsekendőben	OGYI-T-04097/15
- CLEXANE 10000 NE (100 MG)/1 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x1ml előretöltött fecsekendőben	OGYI-T-04097/10
- CLEXANE 2000 NE (20 MG)/0,2 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,2ml előretöltött fecsekendőben	OGYI-T-04097/02
- CLEXANE 4000 NE (40 MG)/0,4 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,4ml előretöltött fecsekendőben	OGYI-T-04097/04
- CLEXANE 6000 NE (60 MG)/0,6 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,6ml előretöltött fecsekendőben	OGYI-T-04097/06

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- CLEXANE 8000 NE (80 MG)/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,8ml előretöltött fecskendőben	OGYI-T-04097/08
- FRAXIPARINE 3800 NE/0,4 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,4ml előretöltött fecskendőben	OGYI-T-06770/03
- FRAXIPARINE 5700 NE/0,6 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,6ml előretöltött fecskendőben	OGYI-T-06770/04
- FRAXIPARINE 7600 NE/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,8ml előretöltött fecskendőben	OGYI-T-06770/05
- FRAXIPARINE 9500 NE/1,0 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x1,0ml előretöltött fecskendőben	OGYI-T-06770/06
- FRAXODI 11400 NE/0,6 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,6ml előretöltött fecskendőben	OGYI-T-08015/02
- FRAXODI 15200 NE/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,8ml előretöltött fecskendőben	OGYI-T-08015/03
- FRAXODI 19000 NE/1,0 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x1ml előretöltött fecskendőben	OGYI-T-08015/04

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D689, I260, I269, I48H0, I6380, I6760, I749, I829, I871, M3110, M3513, M3514, O223, Z298

EÜ100 58.

Támogatott indikációk:

- >> Rekurreáló vagy súlyos (hasmenés napi 10-szer vagy többször fordul elő, vagy 15001 >= fehérvértest/mcgL) clostridium difficile fertőzések kezelésére
- metronidazol és vankomicin kezelés eredménytelensége, illetve rezisztencia esetén, vagy
 - immunszupprimált beteg részére, vagy
 - olyan beteg részére, akinél a fertőzés miatt fel kellene függeszteni az onkológiai vagy hematológiai kezelést.

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Infektológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- DIFICLIR 200 MG FILMTABLETTA	20x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/11/733/004
- DIFICLIR 200 MG FILMTABLETTA FRANCIAORSZÁG	20x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/11/733/004 (FR)
- DIFICLIR 200 MG FILMTABLETTA NÉMETORSZÁG	20x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/11/733/004 (DE)

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): A047, D849

EÜ100 59.

Támogatott indikációk:

- >> Progresszív, lokálisan előrehaladott vagy áttétes, differenciált (papillaris, follicularis, Hürthle sejtes) pajzsmirigy carcinomában szenvedő betegek kezelésére, akik refrakterek a radioaktív jódkészítésre, amennyiben az alábbi kritériumok fennállnak, onkoteam dokumentált javaslata alapján
- 18 évnél idősebb beteg
 - az elmúlt 16 hónapon belül progrediált RECIST szerint (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours - terápiás válasz értékelési kritériumok szolid tumorok esetén)
 - legalább 1 mérhető RECIST lézió
 - performance status ECOG 0-2
 - megfelelő máj, vese és hematológiai paraméterek
 - szérumszint TSH alacsonyabb, mint 0,5 mIU/L

Támogatott indikációk:**A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:**

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Endokrinológia	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Klinikai onkológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- NEXAVAR 200 MG FILMTABLETTA	112x	EU/1/06/342/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C73

Kijelölt intézet
- Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Országos Onkológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 60.**Támogatott indikációk:**

>> Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugárterápia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- KREON 25.000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	100x hdpe tartályban	OGYI-T-04231/03

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C25

EÜ100 61.**Támogatott indikációk:**

>>

Olyan súlyos (eddiggi kezelésekre nem reagáló), krónikus spontán urticariában szenvedő 12 év feletti betegek kezelésére, akik esetében

- legalább 6 hónappal ezelőtt diagnosztizáltak urticariát,
- definíció szerint kizárt a pseudoallergiás, a gyógyszer- és egyéb allergiák, valamint a fertőző gócok szerepe a csalánkiütés hátterében,
- legalább 2 féle antihisztamin kezelést alkalmaztak, amelyből a beteg egyet a maximálisan tolerálható emelt dózisban kapott legalább egy hónapig,
- egyéb harmadik vonalbeli terápiát alkalmaztak, de a beteg nem reagált rá megfelelően vagy nem tolerálta annak mellékhatásait,
- a tünetek jelenleg is aktívak és súlyosak (UAS7>=28 és DLQI>10).

A terápia a 12. hét után akkor folytatható, amennyiben az UAS7 szerint mért betegség tünetei legalább 10 ponttal javultak a 12. heti kezelés végére.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Bőrgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- XOLAIR 150 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	EU/1/05/319/008

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): L5010**Kijelölt intézet**

- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (Veszprém megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 62.**Támogatott indikációk:**

>> Idiopathiás pulmonalis fibrosisban (IPF) szenvedő felnőttek kezelésére

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény szakorvosa	Tüdőgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- ESBRIET 267 MG FILMTABLETTA	252x buboréksomagolásban (fenntartó csomag)	EU/1/11/667/017
- ESBRIET 267 MG KEMÉNY KAPSZULA	252x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/11/667/002
- ESBRIET 801 MG FILMTABLETTA	84x buboréksomagolásban	EU/1/11/667/018
- OFEV 100 MG LÁGY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	EU/1/14/979/002
- OFEV 150 MG LÁGY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	EU/1/14/979/004

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J84

Kijelölt intézet
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk (Csongrád-Csanád megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Mátrai Gyógyintézet (Heves megye)
- Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Tüdőgyógyintézet Törökbálint (Pest megye)

EÜ100 64.**Támogatott indikációk:**

>> N. meningitis C szerocsoportja által okozott invazív megbetegedés megelőzése céljából 2 éves korig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Háziorvos	Megkötés nélkül	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
------------	------------	------------------

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- NEISVAC-C 0,5 ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x0,5ml előretöltött fecskendőben tű nélkül vagy két tűvel	OGYI-T-08389/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Z298

EÜ100 65.

Támogatott indikációk:

>> Előrehaladott Parkinson-kór esetén A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjében meghatározottak szerint.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Neurológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- DACEPTON 10 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x patronban	OGYI-T-22316/11
- DACEPTON 5 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x5darab injekciós üvegben	OGYI-T-22316/10
- DUODOPA 20 MG/ML+5 MG/ML INTESZTINÁLIS GÉL	7x100ml pvc zsákban	OGYI-T-10543/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G20

Kijelölt intézet

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 66.

Támogatott indikációk:

>> Perzisztáló súlyos eozinofil asthma bronchiale kiegészítő kezelése céljából - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszeri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend (felnttörri asthma bronchiale) alapján.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javaslatra írhat
Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 4 hónap.		
Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- CINQAERO 10 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x10ml injekciós üvegben	EU/1/16/1125/001
- CINQAERO 10 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ	1x2,5ml injekciós üvegben	EU/1/16/1125/002
- FASENRA 30 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	EU/1/17/1252/001
- FASENRA 30 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban	EU/1/17/1252/002
- NUCALA 100 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben	EU/1/15/1043/005
- NUCALA 100 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban	EU/1/15/1043/003
- NUCALA 100 MG POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben	EU/1/15/1043/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J4590

Kijelölt intézet
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk (Csongrád-Csanád megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Mátrai Állami Gyógyintézet (Heves megye)
- Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (Budapest)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Tüdőgyógyintézet Törökbálint (Pest megye)

EÜ100 67.**Támogatott indikációk:**

- >> Aromatáz-inhibítorral kombinálva hormonreceptor-pozitív, humán epidermális növekedési faktor 2 (HER2)-negatív, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőrákos betegek kezelésére, akik korábban még nem részesültek aromatáz-inhibítor vagy CDK4/6-gátló kezelésben előrehaladott betegségükre. Pre- vagy perimenopausában lévő nők esetében az endokrin terápiát luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) agonistával kell kombinálni.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- IBRANCE 100 MG FILMTABLETTA	21x buboréksomagolásban pvc/opa/al/pvc/al	EU/1/16/1147/012
- IBRANCE 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	21x buboréksomagolásban pvc/pctfe/pvc/al	EU/1/16/1147/003
- IBRANCE 125 MG FILMTABLETTA	21x buboréksomagolásban pvc/opa/al/pvc/al	EU/1/16/1147/014
- IBRANCE 125 MG KEMÉNY KAPSZULA	21x buboréksomagolásban pvc/pctfe/pvc/al	EU/1/16/1147/005
- IBRANCE 75 MG FILMTABLETTA	21x buboréksomagolásban pvc/opa/al/pvc/al	EU/1/16/1147/010
- IBRANCE 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	21x buboréksomagolásban pvc/pctfe/pvc/al	EU/1/16/1147/001
- KISQALI 200 MG FILMTABLETTA	63x buboréksomagolásban (pctfe/pvc)	EU/1/17/1221/005
- VERZENIOS 100 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban (pctfe/pe/pvc/alu)	EU/1/18/1307/012
- VERZENIOS 150 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban (pctfe/pe/pvc/alu)	EU/1/18/1307/014
- VERZENIOS 50 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban (pctfe/pe/pvc/alu)	EU/1/18/1307/010

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C50

EÜ100 68.

Támogatott indikációk:

>> Kezdeti endokrin-alapú kezelésként, egy aromatáz-inhibitorral kombinálva, a postmenopausában lévő nőknél a hormonreceptor (HR)-pozitív, humán epidermális növekedési faktor-receptor 2 (HER2)-negatív, lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló emlőrák kezelésére

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- KISQALI 200 MG FILMTABLETTA	63x buboréksomagolásban (pctfe/pvc)	EU/1/17/1221/005

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C50

EÜ100 69.**Támogatott indikációk:**

>> Az 1 év alatti gyermekek K-vitaminnal történő kezelésére.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Háziorvos	Megkötés nélkül	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- KONAKION INIET OS 2 MG/0,2 ML INJEKCIÓ (PHOENIX)	5x	008776066 (olasz)
- KONAKION MM PAEDIATRIC 2 MG/0,2 ML OLDATOS INJEKCIÓ (PHARMAROAD)	5x	42976.00.00
- KONAKION MM PAEDIATRIC 2 MG/0,2 ML ORAL/I.V. (HUNGAROPHARMA)	5x0,2 ml	34009 348 646 3 6
- KONAKION MM 2 MG LÖSUNG (HUNGAROPHARMA)	5x0,2 ml	42976.00.00 (DE)
- KONAKION PRIMA INFANZIA 2 MG/0,2 ML ORALE E INIETTABILE (PHARMAROAD)	5x	AIC n*008776066
- KONAKION 2 MG/0,2 ML PAEDIATRIC OLDATOS INJEKCIÓ	5x0,2ml ampulla +szájfecskendő műanyag tálcan és dobozban	OGYI-T-04204/03

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E5610, Z298, Z299

EÜ100 70.**Támogatott indikációk:**

>> Szisztémás szklerózisban másodlagos Raynaud-szindrómával vagy fennálló digitális fekélybetegségben szenvedő betegeknek, akik:

- korábban részesültek kalcium-csatorna blokkoló vagy pentoxifillin kezelésben, vagy ezekre kontraindikáltak, illetve intoleránsak
- első észleléskor vagy követés során 1 éven belül ≥ 3 heg van jelen/keletkezett vagy 1 éven belül 1 aktív, fájdalmas fekélye van/volt
- vagy ujjperc felszívódás klinikai vagy radiológiai jelei megjelentek.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
III. progresszivitási szintű fekvőbeteg gyógyintézet	Allergológia és klinikai immunológia	javasolhat és írhat
III. progresszivitási szintű fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- STAYVEER 125 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/13/832/002
- STAYVEER 125 MG FILMTABLETTA	56x hdpe palackban	EU/1/13/832/006
- STAYVEER 62,5 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban	EU/1/13/832/001
- STAYVEER 62,5 MG FILMTABLETTA	56x hdpe palackban	EU/1/13/832/005

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I7302, M34		

EÜ100 71.**Támogatott indikációk:**

- >> Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti intézményi regisztrációs listán szereplő, bizonyítottan meddő párok asszisztált reprodukciós kezeléséhez
- >> A *-gal jelölt gyógyszerek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által, a 2005. évi XCV. törvény 25. § (6) bekezdése alapján kiadott engedély birtokában rendelkezhetőek kiemelt támogatással

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Szülészeti-nőgyógyászat	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- BEMFOLA 150 NE/0,25 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban +1 injekciós tű	EU/1/13/909/002
- BEMFOLA 225 NE/0,375 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban +1 injekciós tű	EU/1/13/909/003
- BEMFOLA 300 NE/0,50 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban +1 injekciós tű	EU/1/13/909/004
- BEMFOLA 450 NE/0,75 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban +1 injekciós tű	EU/1/13/909/005
- BEMFOLA 75 NE/0,125 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban +1 injekciós tű	EU/1/13/909/001
- CETROTIDE 0,25 MG POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ (ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN)	1x injekciós üvegben	EU/1/99/100/001
- CEZIBOE 0,25 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x előretöltött fecsekendőben buborékcsoomagolásban + 1 törőlkendő	OGYI-T-23798/01
- CHORAPUR 5000 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	3x porüveg+oldószerüveg	OGYI-T-23003/02
- CRINONE 80 MG/G HÜVELYGÉL	15x applikátor	OGYI-T-20730/02
- CYCLOGEST 400 MG HÜVELYKÚP	15x szalagcsomagolásban	OGYI-T-23174/02
* - DIPHERELINE SR 3,75 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	1x porampulla+oldószerampulla	OGYI-T-08169/01
- FOSTIMON HP 75 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üveg+oldószerampulla	OGYI-T-06503/01
- FOSTIMON HP 75 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	10x injekciós üveg+oldószerampulla	OGYI-T-06503/02
- GONAL-F 300 NE/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x0,5ml előretöltött injekciós tollban +8 db tű	EU/1/95/001/033
- GONAL-F 450 NE/0,75 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x0,75ml előretöltött injekciós tollban +12 db tű	EU/1/95/001/034
- GONAL-F 75 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben +1xoldószeres előretöltött fecsekendőben	EU/1/95/001/025
- GONAL-F 900 NE/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x1,5ml előretöltött injekciós tollban +20 db tű	EU/1/95/001/035

	Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
új	- GONAPEPTYL 0,1 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	7x1ml üveg fecskendőben	OGYI-T-21047/01
	- LUVERIS 75 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x porüveg	EU/1/00/155/004
	- MENOPUR 75 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	10x injekciós üvegben + 10 db oldószert tartalmazó 1-es típusú ampulla	OGYI-T-08742/06
	- MERIOFERT KIT 75 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x injekciós üvegben	OGYI-T-22799/01
	- MERIOFERT KIT 75 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	10x injekciós üvegben	OGYI-T-22799/03
*	- NORCOLUT 5 MG TABLETTA	20x buboréksomagolásban	OGYI-T-03453/01
	- OVALEAP 300 NE/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x0,5ml patronban +10 db injekciós tű	EU/1/13/871/001
	- OVALEAP 450 NE/0,75 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x0,75ml patronban +10 db injekciós tű	EU/1/13/871/002
	- OVALEAP 900 NE/1,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x1,5ml patronban +20 db injekciós tű	EU/1/13/871/003
	- OVITRELLE 250 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban	EU/1/00/165/008
	- OVITRELLE 250 MIKROGRAMM/0,5 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x0,5ml előretöltött fecskendőben	EU/1/00/165/007
	- PERGOVERIS 150 NE/75 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x porampulla+oldószerampulla	EU/1/07/396/001
	- PERGOVERIS (300 NE + 150 NE)/0,48 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x0,48ml előretöltött injekciós tollban +5 db injekciós tű	EU/1/07/396/004
	- PERGOVERIS (450 NE + 225 NE)/0,72 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x0,72ml előretöltött injekciós tollban +7 db injekciós tű	EU/1/07/396/005
	- PERGOVERIS (900 NE + 450 NE)/1,44 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x1,44ml előretöltött injekciós tollban +14 db injekciós tű	EU/1/07/396/006
	- PROLUTEX 25 MG OLDATOS INJEKCIÓ	7x injekciós üvegben	OGYI-T-22435/05
*	- PROVERA 10 MG TABLETTA	30x átlátszó buboréksomagolásban	OGYI-T-01242/04
*	- PROVERA 5 MG TABLETTA	30x átlátszó buboréksomagolásban	OGYI-T-01242/03
	- PUREGON 300 NE/0,36 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x patronban +7 tű toll nélkül	EU/1/96/008/038
	- REKOVELLE 12 MIKROGRAMM/0,36 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban +3 injekciós tű	EU/1/16/1150/004
	- REKOVELLE 36 MIKROGRAMM/1,08 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban +6 injekciós tű	EU/1/16/1150/005
	- REKOVELLE 72 MIKROGRAMM/2,16 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x előretöltött injekciós tollban +9 injekciós tű	EU/1/16/1150/006
*	- SUPREFACT OLDATOS INJEKCIÓ	1x5,5ml injekciós üvegben	OGYI-T-04400/05
*	- TUBANIS 2 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23548/01
*	- TUBANIS 2 MG FILMTABLETTA	84x buboréksomagolásban	OGYI-T-23548/02
	- UTROGESTAN 100 MG HÜVELYKAPSZULA	30x buboréksomagolásban	OGYI-T-06628/01
	- UTROGESTAN 200 MG LÁGY HÜVELYKAPSZULA	15x buboréksomagolásban	OGYI-T-06628/03
*	- VISANNE 2 MG TABLETTA	28x buboréksomagolásban (pvc/al fólia)	OGYI-T-21199/01
*	- VISANNE 2 MG TABLETTA	84x buboréksomagolásban (pvc/al fólia)	OGYI-T-21199/02

	Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
*	- ZAFRILLA 2 MG TABLETTA	28x buboréksomagolásban	OGYI-T-23484/01
*	- ZAFRILLA 2 MG TABLETTA	84x buboréksomagolásban	OGYI-T-23484/02

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): N46, N97

Kijelölt intézet

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (Budapest)
- Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest (Budapest)
- KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft., Budapest (Budapest)
- KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft., Győr (Budapest)
- Pannon Reprodukciós Intézet (Baranya megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Róbert Károly Meddőségi Centrum Kft. (Budapest)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 72.

Támogatott indikációk:

- >> Citarabinnal és daunorubicinnel kombinálva olyan korábban nem kezelt, kedvező és intermedier prognózisú genetikai csoportban tartozó, de novo, CD33-pozitív akut myeloid leukaemiában szenvedő 15 év feletti betegeknél alkalmazható, akik alkalmasak kuratív célzatú indukciós kezelésre.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Haematológia	írhat

Termék név	Kiszerezés	Törzskönyvi szám
- MYLOTARG 5 MG POR OLDATOS INFÚZIÓHOZ VALÓ KONCENTRÁTUMHOZ	1x injekciós üvegben	EU/1/18/1277/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C920

Kijelölt intézet

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)

Kijelölt intézet

- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 73.**Támogatott indikációk:**

- >> Újonnan diagnosztizált, FLT3-mutáció-pozitív, akut myeloid leukaemiában (AML) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, standard daunorubicin és citarabin indukciós és nagy dózisu citarabin konszolidációs kemoterápiával kombinálva, amelyet a teljes választ adó betegeknél egy monoterápiában adott midosztaurin fenntartó kezelés követ.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Haematológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- RYDAPT 25 MG LÁGY KAPSZULA	56x buboréksomagolásban	EU/1/17/1218/002

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C920**Kijelölt intézet**

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

EÜ100 74.**Támogatott indikációk:**

- >> Allogén vértépző őssejt-átültetést követően, CMV-szeropozitív [R+], cytomegalovírus reaktiváció és betegség megelőzésére nagykockázatú betegek számára a transzplantációt követő +100. napig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Haematológia	írhat

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- PREVYMIS 240 MG FILMTABLETTA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	EU/1/17/1245/001

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C91, C92, Z9483

Kijelölt intézet

- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Budapest)

EÜ100 76.

Támogatott indikációk:

>> In vitro és/vagy in vivo diagnosztikával igazolt, klinikai tüneteket okozó túlérzékenység gyakran allergizáló táplálékra, gyógyszerre, rovarméregre abban az esetben, ha súlyos szisztémás reakció szerepel a kórtörténetben illetve bármilyen okból (foglakozás, környezet) nagy az anaphylaxia veszélye.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Allergológia és klinikai immunológia	írhat
Megkötés nélkül	Gyermeztüdőgyógyászat	írhat
Megkötés nélkül	Tüdőgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Allergológia és klinikai immunológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermeztüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

Termék név	Kiszerelés	Törzskönyvi szám
- EPIPEN JUNIOR 150 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRE TÖLTÖTT TOLLBAN	1x autoinjektor	OGYI-T-20039/02
- EPIPEN 300 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRE TÖLTÖTT TOLLBAN	1x autoinjektor	OGYI-T-20039/01

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): T78